

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nintedanib Sandoz, 100 mg, kapsułki miękkie  
Nintedanib Sandoz, 150 mg, kapsułki miękkie

### 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

#### Nintedanib Sandoz 100 mg kapsułki miękkie

Każda kapsułka miękka zawiera nintedanibu ezylan w ilości odpowiadającej 100 mg nintedanibu.

#### Nintedanib Sandoz 150 mg kapsułki miękkie

Każda kapsułka miękka zawiera nintedanibu ezylan w ilości odpowiadającej 150 mg nintedanibu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

### 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka miękka (kapsułka).

#### Nintedanib Sandoz, 100 mg, kapsułki miękkie

Produkt leczniczy Nintedanib Sandoz, 100 mg, kapsułki miękkie, to podłużne, nieprzejryste miękkie kapsułki żelatynowe, w kolorze brzoskwiniowym, o długości od 13,5 mm do 17,5 mm, z czerwonym nadrukiem „NT 100”, zawierające żółtą, lepłą zawiesinę.

#### Nintedanib Sandoz, 150 mg, kapsułki miękkie

Produkt leczniczy Nintedanib Sandoz, 150 mg, kapsułki miękkie to podłużne, nieprzejryste miękkie kapsułki żelatynowe, w kolorze brązowym, o długości od 15 mm do 19 mm, z czarnym nadrukiem „NT 150”, zawierające żółtą, lepłą zawiesinę.

### 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

#### 4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Nintedanib Sandoz jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc (ang. *idiopathic pulmonary fibrosis*, IPF).

Produkt leczniczy Nintedanib Sandoz jest również wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu innych, przewlekłych, przebiegających z włóknieniem, śródmiąższowych chorób płuc (ang. *interstitial lung disease*, ILD) o fenotypie postępującym (patrz punkt 5.1).

Produkt leczniczy Nintedanib Sandoz jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat w leczeniu klinicznie istotnych, postępujących, przebiegających z włóknieniem śródmiąższowych chorób płuc (ILD) (patrz punkt 4.2 i 5.1)

Produkt leczniczy Nintedanib Sandoz jest wskazany do stosowania u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 6 lat w leczeniu choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (ang. *systemic sclerosis associated interstitial lung disease*, SSc-ILD).

#### 4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: Leczenie powinien rozpocząć lekarz z doświadczeniem w zakresie leczenia chorób, w których produkt leczniczy Nintedanib Sandoz jest zatwierdzony.

Dzieci i młodzież: leczenie należy rozpoczynać dopiero po konsultacji wielodyscyplinarnego zespołu (lekarzy, radiologów, patologów) mającego doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorób płuc przebiegających z włóknieniem śródmiąższowym (ILD).

### Dawkowanie

#### *Dorośli*

- Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)
- Inne przewlekłe, przebiegające z włóknieniem, śródmiąższowe choroby płuc (ILD) o fenotypie postępującym
- Choroba śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową (SSc-ILD)

Zalecana dawka nintedanibu to 150 mg dwa razy na dobę, podawane w przybliżeniu w 12-godzinnych odstępach.

Dawka 100 mg dwa razy na dobę jest zalecana do stosowania jedynie u pacjentów, którzy nie tolerują dawki 150 mg dwa razy na dobę.

W razie pominięcia dawki należy wznowić podawanie leku w następnym zaplanowanym terminie i w zalecanej dawce. W razie pominięcia dawki pacjent nie powinien przyjmować dawki dodatkowej. Nie stosować dawki większej od zalecanej maksymalnej dawki dobowej 300 mg.

#### *Dostosowanie dawki*

Leczenie działań niepożądanych nintedanibu, oprócz stosownego leczenia objawowego (patrz punkty 4.4 i 4.8) może obejmować zmniejszenie dawki i okresowe przerwanie podawania leku do czasu ustąpienia danego działania niepożądanego do poziomu umożliwiającego kontynuację leczenia. Leczenie nintedanibem można wznowić w pełnej dawce (150 mg dwa razy na dobę u dorosłych pacjentów) lub zmniejszonej dawce (100 mg dwa razy na dobę u dorosłych pacjentów). Jeśli dorosły pacjent nie toleruje dawki 100 mg dwa razy na dobę, należy całkowicie zaprzestać leczenia nintedanibem.

Jeżeli biegunka, nudności i (lub) wymioty utrzymują się pomimo odpowiedniego leczenia objawowego (w tym leczenia przeciwwymiotnego) konieczne może być zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Leczenie można wznowić stosując mniejszą dawkę (100 mg dwa razy na dobę u dorosłych pacjentów) lub pełną dawkę (150 mg dwa razy na dobę u dorosłych pacjentów). W razie utrzymującej się ciężkiej biegunki, nudności i (lub) wymiotów pomimo leczenia objawowego należy zaprzestać leczenia nintedanibem (patrz punkt 4.4).

W razie przerwania leczenia z powodu zwiększenia aktywności aminotransferazy asparaginowej (AspAT) lub aminotransferazy alaninowej (AlAT) do poziomu  $> 3 \times$  górna granica normy (GGN), po powrocie aktywności aminotransferaz do wartości wyjściowych leczenie nintedanibem można ponownie rozpocząć w zmniejszonej dawce (100 mg dwa razy na dobę u dorosłych pacjentów), którą następnie można zwiększyć do pełnej dawki (150 mg dwa razy na dobę u dorosłych pacjentów) (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Szczegółowe zalecenia dotyczące zmniejszenia dawki w przypadku wystąpienia działań niepożądanych u dzieci i młodzieży, patrz tabela 1.

#### *Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat*

- Leczenie klinicznie istotnych, postępujących, przebiegających z włóknieniem śródmiąższowych chorób płuc (ILD)
- Leczenie choroby śródmiąższowej płuc, związanej z twardziną układową (SSc-ILD)

Należy regularnie monitorować wzrost, a u pacjentów przed zakończeniem rozwoju nasad kości długich zaleca się coroczną ocenę zmian w nasadowej płytce wzrostowej za pomocą badań obrazowych kości. Należy rozważyć przerwanie leczenia u pacjentów, u których wystąpią objawy zaburzenia wzrostu lub zmiany w nasadowej płytce wzrostowej (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Należy regularnie przeprowadzać badania stomatologiczne jamy ustnej, co najmniej co 6 miesięcy, aż do zakończenia rozwoju uzębienia (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Zalecana dawka produktu leczniczego Nintedanib Sandoz dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat jest uzależniona od masy ciała pacjenta i jest podawana dwa razy na dobę, w przybliżeniu w 12-godzinnych odstępach (patrz tabela 1). Dawkę należy dostosowywać do masy ciała, w miarę postępu leczenia.

**Tabela 1 Zalecenie dotyczące dawki i zmniejszonej dawki produktu leczniczego Nintedanib Sandoz w miligramach (mg) według masy ciała w kilogramach (kg) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat**

| Zakres masy ciała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dawka nintedanibu                                                                                       | Zmniejszona dawka nintedanibu *                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13,5 <sup>**</sup> -22,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 mg (dwie kapsułki o mocy 25 mg <sup>***</sup> ) dwa razy na dobę                                     | 25 mg (jedna kapsułka o mocy 25 mg <sup>***</sup> ) dwa razy na dobę                                    |
| 23,0-33,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 mg (trzy kapsułki o mocy 25 mg <sup>***</sup> ) dwa razy na dobę                                     | 50 mg (dwie kapsułki o mocy 25 mg <sup>***</sup> ) dwa razy na dobę                                     |
| 33,5-57,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 mg (jedna kapsułka o mocy 100 mg lub cztery kapsułki o mocy 25 mg <sup>***</sup> ) dwa razy na dobę | 75 mg (trzy kapsułki o mocy 25 mg <sup>***</sup> ) dwa razy na dobę                                     |
| 57,5 kg i powyżej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 mg (jedna kapsułka o mocy 150 mg lub sześć kapsułek o mocy 25 mg <sup>***</sup> ) dwa razy na dobę  | 100 mg (jedna kapsułka o mocy 100 mg lub cztery kapsułki o mocy 25 mg <sup>***</sup> ) dwa razy na dobę |
| * <b>Zmniejszona dawka</b> jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby (A w skali Child-Pugh) i w postępowaniu w przypadku wystąpienia działań niepożądanych u dzieci i młodzieży. Więcej informacji na temat postępowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych, patrz powyżej. |                                                                                                         |                                                                                                         |
| <b>**Masa ciała poniżej 13,5 kg:</b><br>Leczenie należy przerwać w przypadku zmniejszenia masy ciała pacjenta poniżej 13,5 kg.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                         |
| <b>***</b> Nie są dostępne kapsułki produktu leczniczego Nintedanib Sandoz o mocy 25 mg, należy rozważyć alternatywne produkty lecznicze dostępne na rynku.                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |

#### Szczególne populacje pacjentów

##### *Pacjenci w podeszłym wieku (≥ 65 lat)*

U pacjentów w podeszłym wieku nie zaobserwowano żadnych ogólnych różnic w zakresie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Co do zasady nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów w wieku ≥ 75 lat zachodzi większe prawdopodobieństwo konieczności zmniejszenia dawki w celu opanowania działań niepożądanych (patrz punkt 5.2).

##### *Zaburzenie czynności nerek*

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. Nie badano bezpieczeństwa stosowania, skuteczności ani farmakokinetyki nintedanibu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 mL/minutę).

##### *Zaburzenie czynności wątroby*

Zalecana dawka nintedanibu u dorosłych pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby (A w skali Child-Pugh) to 100 mg dwa razy na dobę, w przybliżeniu co 12 godzin. W razie wystąpienia działań niepożądanych u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby (A w skali Child-Pugh) należy rozważyć wstrzymanie lub całkowite przerwanie leczenia. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nintedanibu u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby B i C w skali Child-Pugh. Nie zaleca się leczenia produktem leczniczym Nintedanib Sandoz pacjentów z umiarkowanym (B w skali Child-Pugh) ani ciężkim (C w skali Child-Pugh) zaburzeniem czynności

wątroby (patrz punkt 5.2).

#### *Dzieci i młodzież*

Nie badano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności nintedanibu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Z tego powodu leczenie dzieci w wieku poniżej 6 lat nintedanibem nie jest zalecane. Nintedanibu nie badano u pacjentów o masie ciała poniżej 13,5 kg i dlatego nie jest zalecany w tej grupie (patrz punkt 5.1).

#### Sposób podawania

Produkt leczniczy Nintedanib Sandoz jest przeznaczony do przyjmowania doustnego. Kapsułki powinny być przyjmowane podczas posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, przy czym nie wolno ich żuć. Aby uniknąć niezamierzonego kontaktu z zawartością kapsułki, nie należy jej otwierać ani kruszyć (patrz punkt 6.6). Kapsułki produktu leczniczego Nintedanib Sandoz można przyjmować z małą ilością (jedną łyżeczką) miękkiego pokarmu, zimnego lub o temperaturze pokojowej, takiego jak mus jabłkowy lub budyń czekoladowy, i należy je połknąć natychmiast, bez rozgryzania, tak aby kapsułka pozostała nienaruszona.

### **4.3 Przeciwwskazania**

- Nadwrażliwość na nintedanib lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
- Cięża (patrz punkt 4.6).

### **4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania**

#### Zaburzenia żołądka i jelit

##### *Biegunka*

W badaniach klinicznych (patrz punkt 5.1) biegunka była najczęstszym działaniem niepożądanym ze strony przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów działanie niepożądane miało nasilenie łagodne do umiarkowanego i występowało w trakcie pierwszych 3 miesięcy leczenia.

W okresie po wprowadzeniu nintedanibu do obrotu zgłaszano poważne przypadki biegunki prowadzące do odwodnienia i zaburzeń gospodarki elektrolitowej. Pacjentów należy leczyć bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów, stosując odpowiednie nawodnienie i przeciwbiegunkowe produkty lecznicze, np. loperamid; może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Leczenie nintedanibem można wznowić w zmniejszonej dawce lub pełnej dawce (patrz punkt 4.2, Dostosowanie dawki). W razie uporczywej ciężkiej biegunki utrzymującej się pomimo leczenia objawowego, należy zakończyć leczenie nintedanibem.

##### *Nudności i wymioty*

Nudności i wymioty były często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi ze strony przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów z nudnościami i wymiotami zdarzenie to miało nasilenie łagodne do umiarkowanego. W badaniach klinicznych nudności prowadziły do zakończenia stosowania nintedanibu u nie więcej niż 2,1% pacjentów, a wymioty prowadziły do zakończenia stosowania nintedanibu nie więcej niż 1,4% pacjentów.

W razie utrzymywania się objawów pomimo odpowiedniego leczenia wspomagającego (w tym stosowania leków przeciwwymiotnych) konieczne może być zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Leczenie można wznowić w zmniejszonej dawce lub pełnej dawce (patrz punkt 4.2, Dostosowanie dawki). W razie uporczywych ciężkich objawów należy zakończyć leczenie nintedanibem.

#### Czynność wątroby

Nie badano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności nintedanibu u pacjentów z umiarkowanym (B w skali Child-Pugh) ani ciężkim (C w skali Child-Pugh) zaburzeniem czynności wątroby. W związku z tym nie zaleca się leczenia nintedanibem takich pacjentów (patrz punkt 4.2). Z powodu zwiększonej ekspozycji, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby (A w skali Child-Pugh) może być większe. Dorosłych pacjentów

z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby (A w skali Child-Pugh) należy leczyć stosując zmniejszone dawki nintedanibu (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Podczas leczenia nintedanibem obserwowano przypadki polekowego uszkodzenia wątroby, w tym ciężkie uszkodzenia wątroby zakończone zgonem. Większość zdarzeń dotyczących wątroby występuje w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia. Z tego powodu należy oznaczać aktywność aminotransferaz i stężenie bilirubiny przed rozpoczęciem leczenia oraz w pierwszym miesiącu leczenia nintedanibem. Następnie w trakcie dwóch kolejnych miesięcy leczenia pacjentów należy monitorować w regularnych odstępach czasu i później okresowo (np. przy każdej wizycie pacjenta) lub gdy jest to wskazane klinicznie.

W większości przypadków zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, fosfataza alkaliczna (ALP), gamma-glutamylotransferaza (GGT), patrz punkt 4.8) i podwyższenie stężenia bilirubiny było odwracalne po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu podawania produktu leczniczego. W razie oznaczenia zwiększenia stężenia aminotransferaz (AspAT lub AlAT) powyżej 3 x GGN zaleca się zmniejszenie dawki lub zaprzestanie leczenia nintedanibem oraz uważne monitorowanie pacjenta. Po powrocie aktywności aminotransferaz do wartości wyjściowych leczenie nintedanibem można ponownie rozpocząć w pełnej dawce lub ponownie rozpocząć w zmniejszonej dawce, którą następnie można zwiększyć do pełnej dawki (patrz punkt 4.2, Dostosowanie dawki). Jeśli podwyższone wyniki badań wątroby są związane z podmiotowymi lub przedmiotowymi objawami klinicznymi uszkodzenia wątroby, np. żółtaczką, należy na stałe zakończyć leczenie nintedanibem. Należy ocenić inne przyczyny zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych.

U dorosłych pacjentów z małą masą ciała (< 65 kg), u pacjentów rasy żółtej i u kobiet występuje większe ryzyko zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych. Ekspozycja na nintedanib zwiększa się liniowo z wiekiem pacjentów, który również stanowi czynnik ryzyka zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych (patrz punkt 5.2). Zaleca się staranną obserwację pacjentów, u których występują te czynniki ryzyka.

#### Czynność nerek

U pacjentów stosujących nintedanib zgłaszano przypadki zaburzenia czynności/niewydolności nerek, w niektórych przypadkach zakończone zgonem (patrz punkt 4.8).

W trakcie leczenia nintedanibem pacjentów należy monitorować, zwracając szczególną uwagę na pacjentów, u których występują czynniki ryzyka zaburzeń czynności/niewydolności nerek.

W przypadku wystąpienia zaburzenia czynności/niewydolności nerek należy rozważyć modyfikację leczenia (patrz punkt 4.2 Dostosowanie dawki).

#### Krwawienia

Zahamowanie naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (ang. *vascular endothelial growth factor receptor*, VEGFR) może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem krwawień.

Pacjenci ze znanym ryzykiem krwawienia, w tym pacjenci z wrodzoną predyspozycją do krwawień lub otrzymujący leczenie przeciwzakrzepowe w pełnej dawce nie byli włączani do badań klinicznych. W okresie po wprowadzeniu nintedanibu do obrotu zgłaszano przypadki krwawień innych niż ciężkie oraz ciężkich krwawień, z których niektóre zakończyły się zgonem (dotyczące zarówno pacjentów stosujących przeciwzakrzepowe produkty lecznicze lub inne produkty lecznicze mogące powodować krwawienie, jak i niestosujących takich leków). Dlatego też takich pacjentów należy leczyć nintedanibem tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko.

#### Tętnicze epizody zakrzepowo-zatorowe

Z badań klinicznych wykluczono pacjentów z przebyłym niedawno zawałem mięśnia sercowego lub udarem. W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów tętnicze epizody zakrzepowo-zatorowe zgłaszano niezbyt często (2,5% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 0,7% w grupie otrzymującej placebo w badaniach INPULSIS; 0,9% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 0,9% w grupie otrzymującej placebo w badaniu INBUILD; 0,7% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 0,7% w grupie otrzymującej placebo w badaniu SENSICIS). W badaniach INPULSIS zawały mięśnia sercowego występowały u wyższego odsetka pacjentów w grupie otrzymującej nintedanib (1,6%) niż w grupie otrzymującej placebo (0,5%), podczas gdy działania niepożądane odzwierciedlające chorobę niedokrwienną serca występowały z podobną częstością w grupie otrzymującej nintedanib i

grupie otrzymującej placebo. W badaniu INBUILD zawał mięśnia sercowego obserwowano z niewielką częstością: 0,9% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 0,9% w grupie otrzymującej placebo. W badaniu SENSICIS zawał mięśnia sercowego obserwowano z niewielką częstością w grupie otrzymującej placebo (0,7%). Zawału serca nie obserwowano w grupie otrzymującej nintedanib. Należy zachować ostrożność przy leczeniu pacjentów z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, w tym z rozpoznaną chorobą wieńcową. Należy rozważyć przerwanie leczenia u pacjentów, u których wystąpią podmiotowe lub przedmiotowe objawy ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego.

#### Tętniak i rozwarstwienie tętnicy

Stosowanie inhibitorów szlaku VEGF u pacjentów z nadciśnieniem lub bez nadciśnienia może sprzyjać tworzeniu tętniaka i (lub) rozwarstwieniu tętnicy. Przed rozpoczęciem stosowania nintedanibu należy starannie rozważyć to ryzyko, zwłaszcza u pacjentów z takimi czynnikami ryzyka, jak nadciśnienie lub tętniak w wywiadzie.

#### Żyłna choroba zakrzepowo-zatorowa

W badaniach klinicznych nie obserwowano zwiększonego ryzyka żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów leczonych nintedanibem. Ze względu na mechanizm działania nintedanibu pacjenci mogą być bardziej narażeni na zdarzenia zakrzepowo-zatorowe.

#### Perforacja przewodu pokarmowego i niedokrwienne zapalenie okrężnicy

W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów częstość występowania perforacji wynosiła do 0,3% w obydwu grupach leczenia. Ze względu na mechanizm działania nintedanibu pacjenci mogą być bardziej narażeni na perforacje przewodu pokarmowego. W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki perforacji przewodu pokarmowego oraz przypadki niedokrwiennego zapalenia okrężnicy, z których niektóre zakończyły się zgonem. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów po zabiegu chirurgicznym w obrębie jamy brzusznej, z owrzodzeniem trawiennym, chorobą uchyłkową jelit w wywiadzie lub otrzymujących jednocześnie kortykosteroidy lub NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). W związku z tym leczenie nintedanibem można rozpocząć co najmniej 4 tygodnie po zabiegu chirurgicznym jamy brzusznej. W przypadku pacjentów, u których dojdzie do perforacji przewodu pokarmowego lub niedokrwiennego zapalenia okrężnicy, należy całkowicie zaprzestać leczenia produktem leczniczym nintedanibem. W wyjątkowych sytuacjach stosowanie nintedanibu można rozpocząć ponownie po całkowitym ustąpieniu niedokrwiennego zapalenia okrężnicy oraz dokładnej ocenie stanu pacjenta i innych czynników ryzyka.

#### Białkomocz w przedziale wartości nerczycowych i mikroangiopatia zakrzepowa

Po wprowadzeniu nintedanibu do obrotu odnotowano bardzo nieliczne przypadki białkomoczu w przedziale wartości nerczycowych z zaburzeniami lub bez zaburzeń czynności nerek. Wyniki badań histologicznych w pojedynczych przypadkach były charakterystyczne dla mikroangiopatii kłębuszkowej z zakrzepami nerkowymi lub bez zakrzepów nerkowych. Po przerwaniu stosowania nintedanibu obserwowano ustąpienie objawów. W niektórych przypadkach utrzymywał się resztkowy białkomocz. U pacjentów z objawami przedmiotowymi lub podmiotowymi zespołu nerczycowego należy rozważyć przerwanie leczenia.

Stosowanie inhibitorów szlaku VEGF wiązało się z występowaniem mikroangiopatii zakrzepowej (ang. *thrombotic microangiopathy*, TMA), w tym z bardzo niewielką liczbą przypadków zgłaszanych dla nintedanibu. Jeśli u pacjenta otrzymującego nintedanib wyniki badań laboratoryjnych lub klinicznych wskazują na TMA, leczenie nintedanibem należy przerwać i przeprowadzić szczegółową ocenę w kierunku TMA.

#### Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (ang. *posterior reversible encephalopathy syndrome*, PRES)

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłoszono kilka przypadków zespołu tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES). Zespół PRES jest zaburzeniem neurologicznym (potwierdzonym za pomocą obrazowania rezonansu magnetycznego), który może objawiać się bólem głowy, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami widzenia, drgawkami, letargiem, dezorientacją i innymi nieprawidłowościami widzenia oraz neurologicznymi i może prowadzić do zgonu. Zespół PRES zgłaszano podczas stosowania innych inhibitorów VEGF. W przypadku podejrzenia PRES należy przerwać leczenie nintedanibem. Nie ma doświadczenia z ponownym rozpoczynaniem

leczenia nintedanibem u pacjentów, u których wystąpił wcześniej PRES i taka decyzja zależy od oceny lekarza.

#### Nadciśnienie

Podawanie nintedanibu może powodować podwyższenie ciśnienia krwi. Należy mierzyć ciśnienie krwi okresowo i zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.

#### Nadciśnienie płucne

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania nintedanibu u pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Z badań INBUILD i SENCIS wykluczono pacjentów z istotnym nadciśnieniem płucnym (wskaźnik sercowy  $\leq 2$  L/minutę/m<sup>2</sup> lub pozajelitowe stosowanie epoprostenolu/treprostynilu, lub istotna niewydolność prawej komory serca).

Nintedanibu nie należy stosować u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem płucnym. Zaleca się uważne monitorowanie pacjentów z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem płucnym.

#### Powikłania związane z gojeniem się ran

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano zwiększonej częstości przypadków zaburzonego gojenia ran. Nintedanib, z uwagi na swój mechanizm działania, może zaburzać gojenie ran.

Nie przeprowadzono badania mającego na celu ocenę wpływu nintedanibu na gojenie się ran.

Leczenie nintedanibem należy zatem rozpoczynać lub - w przypadku przerwania leczenia w okresie okołoperacyjnym - wznowiać wyłącznie na podstawie oceny klinicznej odpowiedniego gojenia się rany.

#### Jednoczesne podawanie z pirfenidonem

Jednoczesne leczenie nintedanibem z pirfenidonem badano w dedykowanym badaniu farmakokinetycznym z udziałem pacjentów z IPF. Biorąc pod uwagę wyniki tego badania, nie ma dowodów na istnienie istotnej międzylekowej interakcji farmakokinetycznej pomiędzy nintedanibem a pirfenidonem w przypadku podawania ich w skojarzeniu (patrz punkt 5.2). Biorąc pod uwagę podobne profile bezpieczeństwa obydwu produktów leczniczych, można spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych wynikających z działania addytywnego, w tym zdarzeń niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego i wątroby. Nie określono bilansu korzyści i ryzyka jednoczesnego stosowania nintedanibu i pirfenidonu.

#### Wpływ na odstęp QT

W programie badań klinicznych nie stwierdzono dowodów na wydłużenie odstępu QT dla nintedanibu (punkt 5.1). Ponieważ wiadomo, że inne inhibitory kinaz tyrozynowych wpływają na wartość QT, należy zachować ostrożność przy podawaniu nintedanibu pacjentom, u których może dojść do wydłużenia odstępu QTc.

#### Dzieci i młodzież

Dane dotyczące stosowania nintedanibu u dzieci i młodzieży ograniczają się do małej podgrupy śródmiąższowych chorób płuc przebiegających z włóknieniem (ILD) (patrz punkt 5.1). Podgrupa ta nie obejmuje wszystkich etiologii związanych z postępującą, przebiegającą z włóknieniem śródmiąższową chorobą płuc u dzieci i młodzieży.

Istnieje większa niepewność co do zakresu korzyści z leczenia u dzieci i młodzieży niż u dorosłych.

Wymienionych powyżej środków ostrożności u dorosłych pacjentów należy przestrzegać również u dzieci i młodzieży.

Szczegółowe zalecenia dotyczące zmniejszenia dawki u dzieci i młodzieży, patrz Tabela 1.

Szczególne sytuacje dotyczące dzieci i młodzieży opisano poniżej:

#### *Rozwój i wzrost kości*

W badaniach nieklinicznych zaobserwowano odwracalne zmiany płytki wzrostowej nasadowej (patrz punkt 5.3). W badaniu klinicznym prowadzonym z udziałem dzieci i młodzieży nie obserwowano istotnego zmniejszenia tempa wzrostu podczas otrzymywania nintedanibu. Niemniej, nie ma

dostępnych długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z populacji dzieci i młodzieży.

Należy regularnie monitorować wzrost, a u pacjentów przed zakończeniem rozwoju nasad kości długich zaleca się coroczną ocenę zmian w nasadowej płytce wzrostowej za pomocą badań obrazowych kości. Należy rozważyć przerwanie leczenia u pacjentów, u których wystąpią objawy zaburzenia wzrostu lub zmiany w nasadowych płytkach wzrostowych.

#### *Zaburzenia rozwoju zębów*

W badaniach nieklinicznych obserwowano zaburzenia rozwoju zębów (patrz punkt 5.3). W badaniu klinicznym z udziałem dzieci i młodzieży ryzyko zaburzeń rozwoju zębów nie zostało potwierdzone. Jako środek zapobiegawczy należy regularnie, co najmniej co 6 miesięcy, przeprowadzać badania stomatologiczne jamy ustnej aż do zakończenia rozwoju uzębienia.

### **4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji**

#### Glikoproteina P (P-gp)

Nintedanib jest substratem P-gp (patrz punkt 5.2). W badaniu interakcji międzylekowych, równoczesne podawanie nintedanibu z silnym inhibitorem P-gp - ketokonazolem, zwiększało ekspozycję na nintedanib 1,61 raza w oparciu o AUC i 1,83 raza w oparciu o  $C_{max}$ . W badaniu interakcji z silnym induktorem P-gp - ryfampicyną, ekspozycja na nintedanib była zmniejszona do 50,3% w oparciu o AUC i do 60,3% w oparciu o  $C_{max}$  podczas jednoczesnego podawania z ryfampicyną, w porównaniu z podawaniem samego nintedanibu. Silne inhibitory P-gp (np. ketokonazol, erytromycyna lub cyklosporyna) podawane jednocześnie z nintedanibem mogą zwiększyć ekspozycję na nintedanib. W takich przypadkach należy dokładnie obserwować u pacjentów tolerancję nintedanibu. Postępowanie w razie wystąpienia działań niepożądanych może wymagać przerwania leczenia, zmniejszenia dawki lub zakończenia stosowania nintedanibu (patrz punkt 4.2).

Silne induktory P-gp (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i ziele dziurawca) mogą zmniejszać ekspozycję na nintedanib. Należy rozważyć wybór alternatywnego produktu leczniczego do jednoczesnego stosowania, który nie wykazywałby działania indukującego P-gp lub wykazywałby takie działanie w minimalnym stopniu.

#### Enzymy układu cytochromu (CYP)

Nintedanib tylko w niewielkim stopniu metabolizowany jest przez enzymy CYP. W badaniach nieklinicznych nintedanib i jego metabolity, wolna reszta kwasowa BIBF 1202 i jej glukuronian nie hamowały ani nie indukowały enzymów CYP (patrz punkt 5.2). W związku z tym uważa się, że prawdopodobieństwo interakcji nintedanibu z innymi lekami związanymi z metabolizmem CYP jest niewielkie.

#### Jednoczesne podawanie z innymi produktami leczniczymi

Jednoczesne podawanie nintedanibu z doustnymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi nie wpływało w znaczącym stopniu na farmakokinetykę doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 5.2).

Jednoczesne podawanie nintedanibu z bozentanem nie wpływało na farmakokinetykę nintedanibu (patrz punkt 5.2).

#### Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

### **4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację**

#### Kobiety w wieku rozrodczym / Antykoncepcja

Nintedanib może powodować uszkodzenie płodu u ludzi (patrz punkt 5.3). Kobiety w wieku rozrodczym powinny zostać poinformowane o konieczności unikania zajścia w ciążę podczas leczenia nintedanibem i stosowania wysoce skutecznych metod antykoncepcji podczas rozpoczynania leczenia, w okresie leczenia i przez co najmniej 3 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki nintedanibu. Nintedanib

nie miał znaczącego wpływu na ekspozycję na etynyloestradiol i lewonorgestrel w osoczu (patrz punkt 5.2). Wymioty i (lub) biegunka lub inne zaburzenia wpływające na wchłanianie mogą zmniejszać skuteczność doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Kobiетom przyjmującym doustne hormonalne środki antykoncepcyjne, u których występują tego typu zaburzenia, należy zalecić stosowanie alternatywnej wysoce skutecznej metody antykoncepcji.

#### Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania nintedanibu u kobiet w okresie ciąży, jednakże badania niekliniczne na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ tej substancji czynnej na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ponieważ nintedanib może spowodować uszkodzenia płodów także u ludzi, nie może być stosowany w okresie ciąży (patrz punkt 4.3), a przed rozpoczęciem leczenia nintedanibem oraz w jego okresie należy wykonywać testy ciążowe zgodnie z potrzebami.

Pacjentki powinny być poinformowane o konieczności zgłoszenia ewentualnego zajścia w ciążę podczas leczenia nintedanibem swojemu lekarzowi lub farmaceucie.

Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia nintedanibem, trzeba przerwać leczenie oraz należy poinformować ją o możliwym zagrożeniu dla płodu.

#### Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania nintedanibu i jego metabolitów do mleka ludzkiego.

Badania niekliniczne wykazały, że niewielkie ilości nintedanibu i jego metabolitów ( $\leq 0,5\%$  podanej dawki) przenikają do mleka karmiących samic szczura. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Podczas leczenia produktem leczniczym Nintedanib Sandoz należy przerwać karmienie piersią.

#### Płodność

Wyniki badań nieklinicznych nie wskazują na zaburzenie płodności samców (patrz punkt 5.3).

Badania toksyczności przedłużonej i przewlekłej nie przyniosły dowodów świadczących o zaburzeniu płodności samic szczurów przy poziomie ekspozycji ogólnoustrojowej porównywalnym z maksymalną zalecaną dawką u ludzi (ang. *maximum recommended human dose*, MRHD) wynoszącą 150 mg dwa razy na dobę (patrz punkt 5.3).

### **4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Nintedanib wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należy poinformować pacjentów o konieczności zachowania ostrożności w czasie prowadzenia pojazdu lub obsługiwanie maszyn podczas leczenia nintedanibem.

### **4.8 Działania niepożądane**

#### Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych i w okresie po dopuszczeniu do obrotu najczęściej zgłaszane działania niepożądane związane ze stosowaniem nintedanibu obejmowały biegunkę, nudności i wymioty, ból brzucha, zmniejszone łaknienie, zmniejszenie masy ciała i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Postępowanie w razie wybranych działań niepożądanych, patrz punkt 4.4.

#### Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Tabela 2 zawiera podsumowanie działań niepożądanych leków wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania według następującej konwencji:

bardzo często ( $\geq 1/10$ ), często ( $\geq 1/100$  do  $< 1/10$ ), niezbyt często ( $\geq 1/1\,000$  do  $< 1/100$ ), rzadko ( $\geq 1/10\,000$  do  $< 1/1\,000$ ), bardzo rzadko ( $< 1/10\,000$ ), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

**Tabela 2 Zestawienie działań niepożądanych według częstości występowania**

| Częstość występowania                                         |                              |                                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja układów i narządów preferowany termin            | Idiopatyczne włóknienie płuc | Inne przewlekłe, przebiegające z włóknieniem ILD o fenotypie postępującym | Choroba śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową |
| <b>Zaburzenia krwi i układu chłonnego</b>                     |                              |                                                                           |                                                          |
| Małopłytkowość                                                | Niezbyt często               | Niezbyt często                                                            | Niezbyt często                                           |
| <b>Zaburzenia metabolizmu i odżywiania</b>                    |                              |                                                                           |                                                          |
| Zmniejszenie masy ciała                                       | Często                       | Często                                                                    | Często                                                   |
| Zmniejszone łaknienie                                         | Często                       | Bardzo często                                                             | Często                                                   |
| Odwodnienie                                                   | Niezbyt często               | Niezbyt często                                                            | Częstość nieznana                                        |
| <b>Zaburzenia serca</b>                                       |                              |                                                                           |                                                          |
| Zawał mięśnia sercowego                                       | Niezbyt często               | Niezbyt często                                                            | Częstość nieznana                                        |
| <b>Zaburzenia naczyniowe</b>                                  |                              |                                                                           |                                                          |
| Krwawienie (patrz punkt 4.4)                                  | Często                       | Często                                                                    | Często                                                   |
| Nadciśnienie                                                  | Niezbyt często               | Często                                                                    | Często                                                   |
| Tętniak i rozwarstwienie tętnicy                              | Częstość nieznana            | Częstość nieznana                                                         | Częstość nieznana                                        |
| <b>Zaburzenia żołądka i jelit</b>                             |                              |                                                                           |                                                          |
| Biegunka                                                      | Bardzo często                | Bardzo często                                                             | Bardzo często                                            |
| Nudności                                                      | Bardzo często                | Bardzo często                                                             | Bardzo często                                            |
| Bóle brzucha                                                  | Bardzo często                | Bardzo często                                                             | Bardzo często                                            |
| Wymioty                                                       | Często                       | Bardzo często                                                             | Bardzo często                                            |
| Zapalenie trzustki                                            | Niezbyt często               | Niezbyt często                                                            | Nieznana                                                 |
| Zapalenie okrężnicy                                           | Niezbyt często               | Niezbyt często                                                            | Niezbyt często                                           |
| <b>Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych</b>                   |                              |                                                                           |                                                          |
| Polekowe uszkodzenie wątroby                                  | Niezbyt często               | Często                                                                    | Niezbyt często                                           |
| Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych                    | Bardzo często                | Bardzo często                                                             | Bardzo często                                            |
| Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT)     | Często                       | Bardzo często                                                             | Często                                                   |
| Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginowej (AspAT) | Często                       | Często                                                                    | Często                                                   |
| Zwiększenie aktywności gammaglutamylotransferazy (GGT)        | Często                       | Często                                                                    | Często                                                   |
| Hiperbilirubinemia                                            | Niezbyt często               | Niezbyt często                                                            | Częstość nieznana                                        |
| Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP)            | Niezbyt często               | Często                                                                    | Często                                                   |
| <b>Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej</b>                   |                              |                                                                           |                                                          |
| Wysypka                                                       | Często                       | Często                                                                    | Niezbyt często                                           |
| Świąd                                                         | Niezbyt często               | Niezbyt często                                                            | Niezbyt często                                           |
| Łysienie                                                      | Niezbyt często               | Niezbyt często                                                            | Częstość nieznana                                        |
| <b>Zaburzenia nerek i dróg moczowych</b>                      |                              |                                                                           |                                                          |
| Niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)                          | Częstość nieznana            | Częstość nieznana                                                         | Niezbyt często                                           |
| Białkomocz                                                    | Niezbyt często               | Niezbyt często                                                            | Częstość nieznana                                        |
| <b>Zaburzenia układu nerwowego</b>                            |                              |                                                                           |                                                          |
| Ból głowy                                                     | Często                       | Często                                                                    | Często                                                   |

|                                         |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii | Częstość nieznana | Częstość nieznana | Częstość nieznana |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

### Opis wybranych działań niepożądanych

#### *Biegunka*

W badaniach klinicznych (patrz punkt 5.1) biegunka była najczęściej zgłaszanym zdarzeniem dotyczącym ze strony przewodu pokarmowego. U większości pacjentów zdarzenie miało nasilenie łagodne do umiarkowanego. Ponad dwie trzecie pacjentów, u których wystąpiła biegunka, zgłosiło jej wystąpienie po raz pierwszy w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia. U większości pacjentów zdarzenia te leczono lekami przeciwbiegunkowymi, zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia (patrz punkt 4.4). Tabela 3 zawiera zestawienie zgłoszonych zdarzeń biegunki w badaniach klinicznych.

**Tabela 3 Biegunka w badaniach klinicznych w okresie 52 tygodni**

|                                                         | INPULSIS |            | INBUILD |            | SENSCIS |            |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|
|                                                         | Placebo  | Nintedanib | Placebo | Nintedanib | Placebo | Nintedanib |
| Biegunka                                                | 18,4%    | 62,4%      | 23,9%   | 66,9%      | 31,6%   | 75,7%      |
| Ciężka biegunka                                         | 0,5%     | 3,3%       | 0,9%    | 2,4%       | 1,0%    | 4,2%       |
| Biegunka prowadząca do zmniejszenia dawki nintedanibu   | 0%       | 10,7%      | 0,9%    | 16,0%      | 1,0%    | 22,2%      |
| Biegunka prowadząca do przerwania leczenia nintedanibem | 0,2%     | 4,4%       | 0,3%    | 5,7%       | 0,3%    | 6,9%       |

#### *Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych*

W badaniach INPULSIS zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (patrz punkt 4.4) zgłaszano u 13,6% pacjentów leczonych nintedanibem w porównaniu z 2,6% pacjentów otrzymujących placebo. W badaniu INBUILD zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych zgłaszano u 22,6% pacjentów leczonych nintedanibem w porównaniu z 5,7% pacjentów otrzymujących placebo. W badaniu SENCIS zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych zgłaszano u 13,2% pacjentów leczonych nintedanibem w porównaniu z 3,1% pacjentów otrzymujących placebo. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych było odwracalne i nie wiązało się z klinicznymi objawami choroby wątroby. Dalsze informacje na temat szczególnych populacji pacjentów, zalecanych sposobów postępowania i schematów dostosowania dawki w przypadku biegunki i zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych podano dodatkowo odpowiednio w punktach 4.4 i 4.2.

#### *Krwawienie*

W badaniach klinicznych częstość występowania krwawienia była nieznacznie większa u pacjentów leczonych nintedanibem lub porównywalna między ramionami leczenia (10,3% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 7,8% w grupie otrzymującej placebo w badaniach INPULSIS; 11,1% w grupie otrzymującej nintedanib z 12,7% w grupie otrzymującej placebo w badaniu INBUILD; 11,1% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 8,3% w grupie otrzymującej placebo w badaniu SENCIS).

Najczęściej zgłaszanym zdarzeniem w postaci krwawienia było krwawienie z nosa o nasileniu innym niż ciężkie. Ciężkie zdarzenia w postaci krwawienia występowały z niewielką częstością w 2 grupach leczenia (1,3% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 1,4% w grupie otrzymującej placebo w badaniach INPULSIS; 0,9% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 1,5% w

grupie otrzymującej placebo w badaniu INBUILD; 1,4% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 0,7% w grupie otrzymującej placebo w badaniu SENCIS). Zdarzenia w postaci krwawienia w okresie po dopuszczeniu do obrotu dotyczyły między innymi układu pokarmowego, oddechowego i ośrodkowego układu nerwowego, przy czym najczęściej dotyczyły układu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

#### *Białkomocz*

W badaniach klinicznych częstość występowania białkomoczu była niewielka i porównywalna między grupami leczenia (0,8% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 0,5% w grupie otrzymującej placebo w badaniach INPULSIS; 1,5% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 1,8% w grupie otrzymującej placebo w badaniu INBUILD; 1,0% w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 0,0% w grupie otrzymującej placebo w badaniu SENCIS). W badaniach klinicznych nie odnotowano przypadków zespołu nerczycowego. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano bardzo nieliczne przypadki białkomoczu w przedziale wartości nerczycowych z zaburzeniami lub bez zaburzeń czynności nerek. Wyniki badań histologicznych w pojedynczych przypadkach były charakterystyczne dla mikroangiopatii kłębuszkowej z zakrzepami nerkowymi lub bez zakrzepów nerkowych. Po przerwaniu stosowania nintedanibu obserwowano ustąpienie objawów. W niektórych przypadkach utrzymywał się resztkowy białkomocz. U pacjentów z objawami przedmiotowymi lub podmiotowymi zespołu nerczycowego należy rozważyć przerwanie leczenia (patrz punkt 4.4).

#### Dzieci i młodzież

Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży.

Łącznie 39 pacjentów w wieku od 6 do 17 lat było leczonych w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu trwającym 24 tygodnie, po którym następowało leczenie nintedanibem metodą otwartej próby przez różny czas (patrz punkt 5.1). Zgodnie z profilem bezpieczeństwa obserwowanym u dorosłych pacjentów z IPF, innymi przewlekłymi przebiegającymi z włóknieniem ILD o fenotypie postępującym i SSc-ILD, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi nintedanibu w okresie kontrolowanym placebo były biegunka (38,5%), wymioty (26,9%), nudności (19,2%), ból brzucha (19,2%) i ból głowy (11,5%).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych zgłaszane podczas przyjmowania nintedanibu w okresie kontrolowanym placebo obejmowały uszkodzenie wątroby (3,8%) i podwyższone wyniki testów czynnościowych wątroby (3,8%). Z powodu ograniczonych danych nie wiadomo, czy ryzyko uszkodzenia polekowego wątroby u dzieci jest podobne do obserwowanego u dorosłych (patrz punkt 4.4).

Na podstawie wyników badań nieklinicznych, w badaniu klinicznym z udziałem dzieci i młodzieży monitorowano rozwój kości, wzrost i rozwój zębów jako potencjalne ryzyka (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.3).

Odsetek pacjentów, u których stwierdzono w trakcie leczenia nieprawidłowości w obrębie nasadowej płytki wzrostowej, który był podobny w grupach leczenia w 24. tygodniu (7,7 % w obydwu grupach leczenia). Do 52. tygodnia odsetek pacjentów, u których stwierdzono nieprawidłowości, wynosił w grupie nintedanib/nintedanib: 11,5 % i w grupie placebo/nintedanib: 15,4 %.

Odsetek pacjentów, u których stwierdzono w trakcie leczenia nieprawidłowości w badaniu stomatologicznym lub obrazowym, który wynosił 46,2 % w grupie otrzymującej nintedanib i 38,5 % w grupie otrzymującej placebo do 24. tygodnia. Do 52. tygodnia odsetek pacjentów, u których stwierdzono nieprawidłowości, wynosił w grupie nintedanib/nintedanib: 50,0 % i w grupie placebo/nintedanib: 46,2 %.

Nie ma dostępnych długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów w populacji dzieci i młodzieży. Nie ma wystarczającej wiedzy o potencjalnym wpływie na wzrost, rozwój zębów, okres dojrzewania i ryzyko uszkodzenia wątroby.

#### Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzanym działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

#### 4.9 Przedawkowanie

Nie ma swoistego antidotum ani sposobu leczenia przedawkowania nintedanibu. U dwóch pacjentów w programie onkologicznym doszło do przedawkowania wynoszącego maksymalnie 600 mg dwa razy na dobę przez maksymalnie osiem dni. Obserwowane działania niepożądane były zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa nintedanibu, tzn. obejmowały zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i objawy ze strony przewodu pokarmowego. Te działania niepożądane ustąpiły u obu pacjentów. W badaniach INPULSIS jeden pacjent przypadkowo otrzymał dawkę 600 mg na dobę przez ogółem 21 dni. Wystąpiło inne niż poważne zdarzenie niepożądane (zapalenie nosa i gardła), które ustąpiło w okresie przyjmowania nieprawidłowej dawki, bez wystąpienia innych zgłoszonych zdarzeń. W razie przedawkowania należy przerwać podawanie nintedanibu i wdrożyć odpowiednie do sytuacji klinicznej leczenie wspomagające.

### 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

#### 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe, inhibitory kinazy białkowej, kod ATC: L01EX09

##### Mechanizm działania

Nintedanib jest drobnocząsteczkowym inhibitorem kinaz tyrozynowych, w tym receptorów płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. *platelet-derived growth factor receptor*, PDGFR)  $\alpha$  i  $\beta$ , receptorów czynnika wzrostu dla fibroblastów (ang. *fibroblast growth factor receptor*, FGFR) 1-3 i VEGFR 1-3. Dodatkowo nintedanib hamuje białkową kinazę tyrozynową specyficzną dla limfocytów (ang. *lymphocyte-specific tyrosine-protein kinase*, Lck), białkową kinazę tyrozynową lyn (ang. *tyrosine-protein kinase lyn*, Lyn), protoonkogenną białkową kinazę tyrozynową src (ang. *proto-oncogene tyrosine-protein kinase src*, Src) i kinazy receptora czynnika 1 stymulującego tworzenie kolonii (ang. *colony stimulating factor 1 receptor*, CSF1R).

Nintedanib wiąże się kompetycyjnie z miejscem wiązania adenozyntrofosforanów (ATP) tych kinaz i blokuje kaskady przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych, które, jak wykazano, odgrywają rolę w patogenezie włóknienia tkanki w przebiegu choroby śródmiąższowej płuc.

##### Działanie farmakodynamiczne

W badaniach *in vitro* z użyciem komórek ludzkich wykazano, że nintedanib hamuje procesy, które przypuszczalnie biorą udział w inicjowaniu patogenezy włóknienia, uwalnianiu mediatorów profibrotycznych z komórek monocytarnych krwi obwodowej i polaryzacji makrofagów do alternatywnie aktywowanych makrofagów. Wykazano, że nintedanib hamuje podstawowe procesy włóknienia narządów, proliferację i migrację fibroblastów oraz transformację do aktywnego fenotypu miofibroblastów oraz wydzielanie macierzy pozakomórkowej. W badaniach na zwierzętach z wykorzystaniem wielu modeli IPF, twardziny układowej (ang. *systemic sclerosis*, SSc)/SSc-ILD, choroby śródmiąższowej płuc związanej z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS-ILD) i włóknienia innych narządów nintedanib wykazywał działanie przeciwzapalne i przeciwfibrotyczne na płuca, skórę, serce, nerki i wątrobę. Nintedanib wykazywał również działanie na naczynia. Zmniejszał apoptozę komórek śródbłonna mikronaczyń skórnych i osłabiał przebudowę naczyniową płuc, zmniejszając proliferację naczyniowych komórek mięśni gładkich, grubość ścian naczyń krwionośnych płuc i odsetek niedrożnych naczyń krwionośnych płuc.

## Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

### *Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)*

Skuteczność kliniczną nintedanibu badano u pacjentów z IPF w dwóch kontrolowanych placebo, podwójnie zaślepionych, randomizowanych badaniach fazy III, o identycznym przebiegu (INPULSIS-1 (1199.32) i INPULSIS-2 (1199.34)). Z badań wykluczono pacjentów o początkowej wartości FVC < 50% wartości należnej lub zdolności dyfuzyjnej gazów w płucach (DLCO, skorygowanej dla hemoglobiny) < 30% wartości należnej w punkcie początkowym.

Pacjenci byli randomizowani w proporcji 3:2 do grup leczonych nintedanibem w dawce 150 mg lub placebo dwa razy na dobę przez 52 tygodnie.

Pierwszorzędowy punkt końcowy stanowił roczny wskaźnik spadku natężonej pojemności życiowej (ang. *forced vital capacity*, FVC). Kluczowymi drugorzędowymi punktami końcowymi były: zmiana w stosunku do wartości wyjściowych w odniesieniu do całkowitej punktacji w kwestionariuszu SGRO (*Saint George's Respiratory Questionnaire*) po upływie 52 tygodni i czas do pierwszego ostrego zaostrzenia IPF.

### Roczny wskaźnik spadku FVC

Roczny wskaźnik spadku FVC (w mL) był istotnie mniejszy u pacjentów otrzymujących nintedanib niż u pacjentów otrzymujących placebo. Efekt leczenia był spójny w obu badaniach. W tabeli 4 przedstawiono indywidualne i zbiorcze wyniki badań.


**Tabela 4 Roczny wskaźnik spadku FVC (mL) w badaniach INPULSIS-1, INPULSIS-2 oraz zbiorcze dane z tych badań - populacja leczona**

|                                                                                                          | INPULSIS-1        |                                             | INPULSIS-2        |                                             | INPULSIS-1<br>i INPULSIS-2<br>zbiorczo |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                          | Placebo           | Nintedanib<br>150 mg<br>dwa razy na<br>dobę | Placebo           | Nintedanib<br>150 mg<br>dwa razy na<br>dobę | Placebo                                | Nintedanib<br>150 mg<br>dwa razy na<br>dobę |
| Liczba<br>analizowanych<br>pacjentów                                                                     | 204               | 309                                         | 219               | 329                                         | 423                                    | 638                                         |
| Wskaźnik <sup>1</sup> (SE)<br>spadku w ciągu<br>52 tygodni                                               | -239,9<br>(18,71) | -114,7<br>(15,33)                           | -207,3<br>(19,31) | -113,6<br>(15,73)                           | -223,5<br>(13,45)                      | -113,6<br>(10,98)                           |
| Porównanie w porównaniu z placebo                                                                        |                   |                                             |                   |                                             |                                        |                                             |
| Różnica <sup>1</sup>                                                                                     |                   | 125,3                                       |                   | 93,7                                        |                                        | 109,9                                       |
| 95% CI                                                                                                   |                   | (77,7,<br>172,8)                            |                   | (44,8,<br>142,7)                            |                                        | (75,9,<br>144,0)                            |
| Wartość p                                                                                                |                   | < 0,0001                                    |                   | 0,0002                                      |                                        | < 0,0001                                    |
| <sup>1</sup> Szacunkowa wartość oparta na modelu regresji dla efektów losowych.<br>CI: przedział ufności |                   |                                             |                   |                                             |                                        |                                             |

W analizie wrażliwości, w której przyjęto, że u pacjentów z brakującymi danymi w tygodniu 52 spadek FVC po ostatniej zaobserwowanej wartości byłby taki sam, jak u wszystkich pacjentów otrzymujących placebo, skorygowana różnica w rocznym wskaźniku spadku między nintedanibem a placebo wyniosła 113,9 mL/rok (95% CI 69,2, 158,5) w badaniu INPULSIS-1 oraz 83,3 mL/rok (95% CI 37,6, 129,0) w badaniu INPULSIS-2.

Ocenę zmiany w stosunku do wartości wyjściowej w czasie, w obydwu grupach leczenia, na podstawie analizy zbiorczej danych z badań INPULSIS-1 i INPULSIS-2 przedstawiono na Rycinie 1.

**Rycina 1 Średnia (SEM) zaobserwowana zmiana FVC z stosunku do wartości wyjściowej (mL) w czasie - zbiorcze dane z badań INPULSIS-1 i INPULSIS-2**



#### Analiza pacjentów, u których nastąpiła odpowiedź w zakresie FVC

W obu badaniach INPULSIS odsetek pacjentów, u których wykazano odpowiedź w zakresie FVC, zdefiniowanych jako pacjenci z bezwzględnym przewidywanym zmniejszeniem procentowym FVC nieprzekraczającym 5% (próg wskazujący na wzrastające zagrożenie śmiertelnością w IPF) był istotnie wyższy w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z placebo. Podobne wyniki obserwowano w analizach z zastosowaniem konserwatywnego progu 10%. Indywidualne i zbiorcze wyniki badań przedstawiono w tabeli 5.

**Tabela 5 Odsetek pacjentów, u których po 52 tygodniach nastąpiła odpowiedź w zakresie FVC w badaniach INPULSIS-1, INPULSIS-2 oraz zbiorcze dane z tych badań - populacja leczona**

|                                | INPULSIS-1 |                                    | INPULSIS-2 |                                    | INPULSIS-1 i INPULSIS-2 zbiorczo |                                    |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                | Placebo    | Nintedanib 150 mg dwa razy na dobę | Placebo    | Nintedanib 150 mg dwa razy na dobę | Placebo                          | Nintedanib 150 mg dwa razy na dobę |
| Liczba analizowanych pacjentów | 204        | 309                                | 219        | 329                                | 423                              | 638                                |

|                                                                                       |            |              |            |              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Próg 5%</b>                                                                        |            |              |            |              |            |              |
| Liczba (odsetek) pacjentów, u których nastąpiła odpowiedź w zakresie FVC <sup>1</sup> | 78 (38,2)  | 163 (52,8)   | 86 (39,3)  | 175 (53,2)   | 164 (38,8) | 338 (53,0)   |
| Porównanie z placebo                                                                  |            |              |            |              |            |              |
| Iloraz szans                                                                          |            | 1,85         |            | 1,79         |            | 1,84         |
| 95% CI                                                                                |            | (1,28, 2,66) |            | (1,26, 2,55) |            | (1,43, 2,36) |
| Wartość p <sup>2</sup>                                                                |            | 0,0010       |            | 0,0011       |            | < 0,0001     |
| <b>Próg 10%</b>                                                                       |            |              |            |              |            |              |
| Liczba (odsetek) pacjentów, u których nastąpiła odpowiedź w zakresie FVC <sup>1</sup> | 116 (56,9) | 218 (70,6)   | 140 (63,9) | 229 (69,6)   | 256 (60,5) | 447 (70,1)   |
| Porównanie z placebo                                                                  |            |              |            |              |            |              |
| Iloraz szans                                                                          |            | 1,91         |            | 1,29         |            | 1,58         |
| 95% CI                                                                                |            | (1,32, 2,79) |            | (0,89, 1,86) |            | (1,21, 2,05) |
| Wartość p <sup>2</sup>                                                                |            | 0,0007       |            | 0,1833       |            | 0,0007       |

<sup>1</sup> Pacjenci, u których nastąpiła odpowiedź na leczenie to pacjenci, u których nie wystąpiło bezwzględne zmniejszenie wynoszące więcej niż 5% lub więcej niż 10% należnego FVC %, w zależności od progu i przy ocenie FVC po 52 tygodniach.

<sup>2</sup> Na podstawie regresji logistycznej.

*Czas do progresji ( $\geq 10\%$  bezwzględnego spadku wobec wartości należnej FVC% lub zgon)*

W obu badaniach INPULSIS ryzyko progresji było w sposób istotny statystycznie obniżone dla pacjentów leczonych nintedanibem w porównaniu z placebo. W analizie zbiorczej wartość HR wyniosła 0,60, wskazując na 40% obniżenie ryzyka progresji dla pacjentów leczonych nintedanibem w porównaniu z placebo.

**Tabela 6 Udział pacjentów z  $\geq 10\%$  bezwzględnego spadku wobec wartości należnej FVC% lub zmarłych w ciągu 52 tygodni oraz czas do wystąpienia progresji w badaniach INPULSIS-1, INPULSIS-2 oraz zbiorcze dane z tych badań - populacja leczona**

|                                                | INPULSIS-1 |                                    | INPULSIS-2 |                                    | INPULSIS-1 i INPULSIS-2 zbiorczo |                                    |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                | Placebo    | Nintedanib 150 mg dwa razy na dobę | Placebo    | Nintedanib 150 mg dwa razy na dobę | Placebo                          | Nintedanib 150 mg dwa razy na dobę |
| Liczba zagrożonych                             | 204        | 309                                | 219        | 329                                | 423                              | 638                                |
| Pacjenci, u których wystąpiły zdarzenia, N (%) | 83 (40,7)  | 75 (24,3)                          | 92 (42,0)  | 98 (29,8)                          | 175 (41,4)                       | 173 (27,1)                         |
| Porównanie z placebo <sup>1</sup>              |            |                                    |            |                                    |                                  |                                    |
| Wartość p <sup>2</sup>                         |            | 0,0001                             |            | 0,0054                             |                                  | < 0,0001                           |
| Współczynnik ryzyka <sup>3</sup>               |            | 0,53                               |            | 0,67                               |                                  | 0,60                               |

|                                                                                           |  |              |  |              |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 95% CI                                                                                    |  | (0,39, 0,72) |  | (0,51, 0,89) |  | (0,49, 0,74) |
| <sup>1</sup> Na podstawie danych zgromadzonych do 372 dni (52 tygodnie + margines 7 dni). |  |              |  |              |  |              |
| <sup>2</sup> Na podstawie testu logarytmicznego rang.                                     |  |              |  |              |  |              |
| <sup>3</sup> Na podstawie modelu regresji Coxa.                                           |  |              |  |              |  |              |

#### Zmiana ogólnej punktacji SGRO po 52 tygodniach w stosunku do wartości wyjściowych

W zbiorczej analizie danych z badań INPULSIS punktacja w kwestionariuszu SGRQ (ang. *St. George's Respiratory Questionnaire*) w punkcie początkowym wynosiła 39,51 w grupie otrzymującej nintedanib i 39,58 w grupie otrzymującej placebo. Szacowana średnia zmiana ogólnej punktacji SGRQ w stosunku do wartości wyjściowych do tygodnia 52 była mniejsza w grupie otrzymującej nintedanib (3,53) niż w grupie otrzymującej placebo (4,96), przy różnicy między grupami leczenia wynoszącej -1,43 (95% CI: -3,09, 0,23; p=0,0923).

Ogółem wpływ nintedanibu na jakość życia związaną ze zdrowiem mierzoną za pomocą ogólnej punktacji SGRQ jest niewielki, co wskazuje na mniejsze pogorszenie niż w przypadku placebo.

#### Czas do pierwszego nagłego zaostrzenia IPF

W analizie zbiorczej badań INPULSIS niższe liczbowo ryzyko wystąpienia pierwszego nagłego zaostrzenia obserwowano w przypadku pacjentów otrzymujących nintedanib w porównaniu z placebo. Indywidualne i zbiorcze wyniki badań przedstawiono w tabeli 7.

**Tabela 7 Udział pacjentów z nagłym zaostrzeniem IPF w ciągu 52 tygodni czas do wystąpienia pierwszego zaostrzenia - analiza oparta na zgłoszeniach zdarzeń przez badaczy w badaniach INPULSIS-1, INPULSIS-2 oraz zbiorcze dane z tych badań - populacja leczona**

|                                                                                           | INPULSIS-1 |                                             | INPULSIS-2 |                                          | INPULSIS-1<br>i INPULSIS-2<br>zbiorczo |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                           | Placebo    | Nintedanib<br>150 mg<br>dwa razy<br>na dobę | Placebo    | Nintedanib<br>150 mg dwa<br>razy na dobę | Placebo                                | Nintedanib<br>150 mg<br>dwa razy<br>na dobę |
| Liczba zagrożonych                                                                        | 204        | 309                                         | 219        | 329                                      | 423                                    | 638                                         |
| Pacjenci, u których<br>wystąpiły zdarzenia,<br>N (%)                                      | 11 (5,4)   | 19 (6,1)                                    | 21 (9,6)   | 12 (3,6)                                 | 32 (7,6)                               | 31 (4,9)                                    |
| Porównanie z placebo <sup>1</sup>                                                         |            |                                             |            |                                          |                                        |                                             |
| Wartość p <sup>2</sup>                                                                    |            | 0,6728                                      |            | 0,0050                                   |                                        | 0,0823                                      |
| Współczynnik ryzyka <sup>3</sup>                                                          |            | 1,15                                        |            | 0,38                                     |                                        | 0,64                                        |
| 95% CI                                                                                    |            | (0,54, 2,42)                                |            | (0,19, 0,77)                             |                                        | (0,39, 1,05)                                |
| <sup>1</sup> Na podstawie danych zgromadzonych do 372 dni (52 tygodnie + margines 7 dni). |            |                                             |            |                                          |                                        |                                             |
| <sup>2</sup> Na podstawie testu logarytmicznego rang.                                     |            |                                             |            |                                          |                                        |                                             |
| <sup>3</sup> Na podstawie modelu regresji Coxa.                                           |            |                                             |            |                                          |                                        |                                             |

Podczas z góry ustalonej analizy wrażliwości, odsetek pacjentów z co najmniej 1 potwierdzonym zaostrzeniem, które wystąpiło w ciągu 52 tygodni był niższy w grupie otrzymującej nintedanib (1,9% pacjentów) niż w grupie otrzymującej placebo (5,7% pacjentów). Analiza czasu do wystąpienia zdarzeń w postaci potwierdzonych zaostrzeń z użyciem zbiorczych danych dała ryzyko względne (ang. *hazard ratio*, HR) wynoszące 0,32 (95% CI, 0,16, 0,65; p=0,0010).

#### Analiza przeżycia

Podczas z góry ustalonej analizy zbiorczej danych dotyczących przeżycia w badaniach INPULSIS całkowita śmiertelność w ciągu 52 tygodni była niższa w grupie otrzymującej nintedanib (5,5% pacjentów) niż w grupie otrzymującej placebo (7,8% pacjentów). Analiza czasu do zgonu dała HR wynoszące 0,70 (95% CI, 0,43, 1,12; p=0,1399). Wyniki dotyczące wszystkich punktów końcowych dotyczących przeżycia (takich jak śmiertelność w trakcie leczenia i śmiertelność z powodu chorób układu oddechowego) wykazały spójną różnicę liczbową na korzyść nintedanibu.

**Tabela 8 Śmiertelność z dowolnych przyczyn po 52 tygodniach w badaniach INPULSIS-1, INPULSIS-2 oraz zbiorcze dane z tych badań - populacja leczona**

|                                                                                                                                                                                                       | INPULSIS-1 |                                    | INPULSIS-2 |                                    | INPULSIS-1 i INPULSIS-2 zbiorczo |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | Placebo    | Nintedanib 150 mg dwa razy na dobę | Placebo    | Nintedanib 150 mg dwa razy na dobę | Placebo                          | Nintedanib 150 mg dwa razy na dobę |
| Liczba zagrożonych                                                                                                                                                                                    | 204        | 309                                | 219        | 329                                | 423                              | 638                                |
| Pacjenci, u których wystąpiły zdarzenia, N (%)                                                                                                                                                        | 13 (6,4)   | 13 (4,2)                           | 20 (9,1)   | 22 (6,7)                           | 33 (7,8)                         | 35 (5,5)                           |
| Porównanie z placebo <sup>1</sup>                                                                                                                                                                     |            |                                    |            |                                    |                                  |                                    |
| Wartość p <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                |            | 0,2880                             |            | 0,2995                             |                                  | 0,1399                             |
| Współczynnik ryzyka <sup>3</sup>                                                                                                                                                                      |            | 0,63                               |            | 0,74                               |                                  | 0,70                               |
| 95% CI                                                                                                                                                                                                |            | (0,29, 1,36)                       |            | (0,40, 1,35)                       |                                  | (0,43, 1,12)                       |
| <sup>1</sup> Na podstawie danych zgromadzonych do 372 dni (52 tygodnie + margines 7 dni).<br><sup>2</sup> Na podstawie testu logarytmicznego rang.<br><sup>3</sup> Na podstawie modelu regresji Coxa. |            |                                    |            |                                    |                                  |                                    |

#### Długotrwałe leczenie nintedanibem u pacjentów z IPF (INPULSIS-ON)

W otwartym badaniu przedłużonym z zastosowaniem nintedanibu wzięło udział 734 pacjentów z IPF. Pacjenci, którzy ukończyli 52-tygodniowy okres leczenia w badaniu INPULSIS, otrzymywali leczenie nintedanibem w otwartym badaniu przedłużonym INPULSIS-ON. Mediana czasu ekspozycji u pacjentów leczonych nintedanibem zarówno w badaniu INPULSIS, jak i INPULSIS-ON wynosiła 44,7 miesięcy (zakres 11,9 – 68,3). Eksploracyjne punkty końcowe dotyczące skuteczności obejmowały roczny wskaźnik spadku FVC przez okres 192 tygodni, który wynosił –135,1 (5,8) mL/rok u wszystkich leczonych pacjentów i był spójny z rocznym wskaźnikiem spadku FVC u pacjentów leczonych nintedanibem w badaniach fazy III INPULSIS (–113,6 mL na rok). Profil zdarzeń niepożądanych nintedanibu w badaniu INPULSIS-ON był zgodny z profilem zdarzeń niepożądanych w badaniach fazy III INPULSIS.

#### Pacjenci z IPF z zaawansowanymi zaburzeniami czynności płuc (INSTAGE)

Badanie INSTAGE było 24-tygodniowym, wielośrodkowym, wielonarodowym, prospektywnym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, prowadzonym w grupach równoległych badaniem klinicznym z udziałem pacjentów z IPF z zaawansowanymi zaburzeniami czynności płuc (DLCO ≤ 35% wartości należnej). 136 pacjentów było leczonych produktem leczniczym nintedanibem w monoterapii. Wynik dotyczący pierwszorzędnego punktu końcowego wykazał zmniejszenie łącznej punktacji uzyskanej w kwestionariuszu SGRQ o -0,77 jednostek w 12. tygodniu, w oparciu o skorygowaną średnią zmianę od punktu początkowego. Porównanie *post hoc* wykazało, że spadek FVC u tych pacjentów był spójny ze spadkiem FVC u pacjentów z mniej zaawansowaną chorobą i leczonych nintedanibem w badaniach fazy III INPULSIS.

Profil bezpieczeństwa stosowania i tolerancji nintedanibu u pacjentów z IPF z zaawansowanymi zaburzeniami czynności płuc był zgodny z profilem obserwowanym w badaniach fazy III INPULSIS.

#### Dodatkowe dane pochodzące z badania fazy IV INJOURNEY, w którym stosowano nintedanib 150 mg dwa razy na dobę łącznie z pirfenidonem

Jednoczesne leczenie nintedanibem z pirfenidonem badano w eksploracyjnym badaniu klinicznym prowadzonym metodą otwartej próby z randomizacją porównującym stosowanie nintedanibu w dawce 150 mg dwa razy na dobę ws kojarzeniu z pirfenidonem (dawka zwiększana do 801 mg trzy razy na dobę) i samego nintedanibu w dawce 150 mg dwa razy na dobę u 105 randomizowanych pacjentów przez 12 tygodni. Pierwszorzędowy punkt końcowy stanowił odsetek pacjentów, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego od początku badania do 12. tygodnia.

Zdarzenia niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego występowały często i były zgodne z ustalonym profilem bezpieczeństwa każdego z leków. U pacjentów leczonych nintedanibem

jednocześnie z pirfenidonem w porównaniu z samym nintedanibem najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były biegunka, nudności i wymioty. Średnia (SE) bezwzględna zmiana od wartości wyjściowych FVC w 12. tygodniu wyniosła -13,3 (17,4) mL u pacjentów leczonych nintedanibem łącznie z pirfenidonem (n=48) w porównaniu z -40,9 (31,4) mL u pacjentów leczonych samym nintedanibem (n=44).

*Inne przewlekłe przebiegające z włóknieniem śródmiąższowe choroby płuc (ILD) o fenotypie postępującym*

Skuteczność kliniczną nintedanibu badano u pacjentów z innymi przewlekłymiILD przebiegającymi z włóknieniem o fenotypie postępującym w prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu fazy III (INBUILD). Pacjenci z IPF byli wykluczeni. Pacjentów z klinicznym rozpoznaniem przewlekłejILD przebiegającej z włóknieniem włączano, jeśli występowało u nich istotne włóknienie (cechy włóknienia zajmujące powyżej 10%) w badaniu tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (ang. high resolution computed tomography, HRCT) oraz kliniczne objawy przedmiotowe progresji (zdefiniowane jako spadek FVC  $\geq 10\%$ , spadek FVC  $\geq 5\%$  i  $< 10\%$  z nasileniem się objawów lub pogorszeniem wyników badań obrazowych lub z nasileniem się objawów i pogorszeniem wyników badań obrazowych w okresie 24 miesięcy przed przesiewem). Pacjenci musieli mieć wartość FVC większą niż lub równą 45% wartości należnej, a wartość DLCO (zdolność dyfuzji gazów w płucach, ang. *diffusion lung capacity for carbon monoxide*) musiała mieścić się w zakresie od 30% do mniej niż 80% wartości należnej. U pacjentów musiała występować progresja mimo leczenia uznawanego za odpowiednie w praktyce klinicznej dla danejILD.

W sumie 663 pacjentów zostało zrandomizowanych w stosunku 1:1 do otrzymywania nintedanibemu 150 mg dwa razy na dobę lub równowartości placebo przez co najmniej 52 tygodnie. Mediana ekspozycji na nintedanib przez cały okres trwania badania wynosiła 17,4 miesiąca, a średnia ekspozycja na nintedanib przez cały okres trwania badania wynosiła 15,6 miesiąca. Randomizacja była stratyfikowana w oparciu o obrazy włóknienia w badaniu HRCT zgodnie z oceną głównych recenzentów. Zrandomizowano 412 pacjentów, u których w badaniu HRCT rozpoznano obraz włóknienia podobny do zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (ang. *usual interstitial pneumonia*, UIP), oraz 251 pacjentów, u których w badaniu HRCT rozpoznano inne obrazy włóknienia. W badaniu zdefiniowano 2 równorzędne populacje do analiz: wszyscy pacjenci (populacja całkowita) oraz pacjenci, u których w badaniu HRCT rozpoznano obraz włóknienia podobny do UIP. Pacjenci, u których w badaniu HRCT rozpoznano inne obrazy włóknienia, stanowili populację „dodatkową”.

Pierwszorzędowy punkt końcowy stanowił roczny wskaźnik spadku natężonej pojemności życiowej (FVC) (w mL) w ciągu 52 tygodni. Głównymi drugorzędowymi punktami końcowymi były bezwzględna zmiana od punktu początkowego w łącznej punktacji w skróconym kwestionariuszu King's Brief Interstitial Lung Disease Questionnaire (K-BILD) po upływie 52 tygodni, czas do pierwszego ostrego zaostrzeniaILD lub zgon w ciągu 52 tygodni oraz czas do zgonu w ciągu 52 tygodni.

Średni wiek pacjentów (odchylenie standardowe [standard deviation (SD, min-maks)]) wynosił 65,8 (9,8; 27-87) lat, a średni odsetek wartości należnej FVC 69,0% (15,6; 42-137). Podstawowe kliniczne rozpoznaniaILD w grupach reprezentowanych w badaniu obejmowały zapalenie płuc z nadwrażliwości (26,1%), autoimmunologiczneILD (25,6%), idiopatyczne niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc (18,9%), nieklasyfikowane idiopatyczne śródmiąższowe zapalenie płuc (17,2%) oraz inneILD (12,2%).

Badanie INBUILD nie miało na celu ani nie miało mocy statystycznej, aby dostarczyć dowodów na korzyść wynikającą ze stosowania nintedanibu w określonych podgrupach diagnostycznych. Wykazano spójne efekty w podgrupach opartych na diagnozachILD. Doświadczenie dotyczące stosowania nintedanibu w bardzo rzadkich postępujących śródmiąższowych chorobach płuc przebiegających z włóknieniem jest ograniczone.

### Roczny wskaźnik spadku FVC

Roczny wskaźnik spadku FVC (w mL) w ciągu 52 tygodni był istotnie mniejszy o 107,0 mL u pacjentów otrzymujących nintedanib, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (tabela 9), co odpowiadało względnej skuteczności leczenia na poziomie 57,0%.


**Tabela 9 Roczny wskaźnik spadku FVC (mL) w ciągu 52 tygodni**

|                                                      | Placebo       | Nintedanib<br>150 mg dwa razy na dobę |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Liczba analizowanych pacjentów                       | 331           | 332                                   |
| Wskaźnik <sup>1</sup> (SE) spadku w ciągu 52 tygodni | -187,8 (14,8) | -80,8 (15,1)                          |
| Porównanie z placebo                                 |               |                                       |
| Różnica <sup>1</sup>                                 |               | 107,0                                 |
| 95% CI                                               |               | (65,4; 148,5)                         |
| wartość p                                            |               | < 0,0001                              |

<sup>1</sup>W oparciu o współczynnik regresji dla efektów losowych ze stałymi kategorycznymi efektami leczenia, obraz w badaniu HRCT, stałe ciągłe efekty czasu, FVC [w mL] w punkcie początkowym oraz z uwzględnieniem zależności leczenia i czasu oraz punktu początkowego i czasu.

Podobne wyniki obserwowano w równorzędnej populacji pacjentów, u których w badaniu HRCT rozpoznano obraz włóknienia podobny do UIP. Skuteczność leczenia była spójna w populacji dodatkowej pacjentów, u których w badaniu HRCT rozpoznano inny obraz włóknienia (wartość p interakcji 0,2268) (rycina 2).

**Rycina 2 Wykres typu forest plot rocznego wskaźnika spadku FVC (mL) w ciągu 52 tygodni w populacjach pacjentów**



\* nominalna wartość p (p=0,014)


Różnica nintedanib 150 mg bid – placebo w zakresie skorygowanego wskaźnika spadku FVC [mL] w ciągu 52 tygodni z 95% przedziałem ufności

bid = dwa razy na dobę

Wyniki działania nintedanibu w zakresie zmniejszania rocznego wskaźnika spadku FVC potwierdzono we wszystkich górnym ustalonych analizach wrażliwości i obserwowano spójne wyniki w z górnym ustalonych podgrupach skuteczności: płeć, grupa wiekowa, rasa, wartości należnej FVC % w punkcie początkowym oraz pierwotne kliniczne rozpoznanie ILD w grupach.

Rycina 3 przedstawia ewolucję zmiany FVC od punktu początkowego w czasie w grupach leczenia.

**Rycina 3 Średnia (SEM) zaobserwowana zmiana FVC od punktu początkowego (mL) w ciągu 52 tygodni**



bid = dwa razy na dobę

Ponadto korzystne działanie nintedanibu obserwowano dla skorygowanej średniej bezwzględnej zmiany wartości należnej FVC % względem punktu początkowego w 52 tygodniu. Skorygowana średnia bezwzględna zmiana wartości należnej FVC % od punktu początkowego do 52 tygodnia była mniejsza w grupie otrzymującej nintedanib (-2,62%) niż w grupie otrzymującej placebo (-5,86%). Skorygowana średnia różnica między grupami leczenia wynosiła 3,24 (95% CI: 2,09; 4,40, nominalna wartość  $p < 0,0001$ ).

#### Analiza pacjentów z odpowiedzią w zakresie FVC

Odsetek pacjentów z odpowiedzią w zakresie FVC, zdefiniowanych jako pacjenci ze względnym spadkiem wartości należnej FVC % nie większym niż 5%, był większy w grupie nintedanibu w porównaniu z placebo. Podobne wyniki obserwowano w analizach, w których zastosowano próg 10% (tabela 10).

**Tabela 10 Odsetek pacjentów z odpowiedzią w zakresie FVC po 52 tygodniach w badaniu INBUILD**

|                                                                | Placebo    | Nintedanib<br>150 mg dwa razy na dobę |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Liczba analizowanych pacjentów                                 | 331        | 332                                   |
| <b>Próg 5%</b>                                                 |            |                                       |
| Liczba (%) pacjentów z odpowiedzią w zakresie FVC <sup>1</sup> | 104 (31,4) | 158 (47,6)                            |
| Porównanie z placebo                                           |            |                                       |
| Iloraz szans <sup>2</sup>                                      |            | 2,01                                  |
| 95% CI                                                         |            | (1,46; 2,76)                          |
| Nominalna wartość p                                            |            | < 0,0001                              |
| <b>Próg 10%</b>                                                |            |                                       |
| Liczba (%) pacjentów z odpowiedzią w zakresie FVC <sup>1</sup> | 169 (51,1) | 197 (59,3)                            |
| Porównanie z placebo                                           |            |                                       |
| Iloraz szans <sup>2</sup>                                      |            | 1,42                                  |
| 95% CI                                                         |            | (1,04; 1,94)                          |
| Nominalna wartość p                                            |            | 0,0268                                |


<sup>1</sup>Pacjenci z odpowiedzią na leczenie to pacjenci, u których nie wystąpił względny spadek wynoszący więcej niż 5% lub więcej niż 10% wartości należnej FVC %, w zależności od progu i z oceną FVC po upływie 52 tygodni (pacjentów z brakującymi danymi po upływie 52 tygodni uznawano za pacjentów bez odpowiedzi).

<sup>2</sup>Na podstawie modelu regresji logistycznej ze współzmienną ciągłą będącą wartością należną FVC % w punkcie początkowym i współzmienną binarną będącą obrazem w badaniu HRCT

*Czas do pierwszego nagłego zaostrzenia ILD lub zgonu*

Przez cały czas trwania badania odsetek pacjentów, u których wystąpiło co najmniej jedno zdarzenie pierwszego nagłego zaostrzenia ILD lub zgon, wynosił 13,9% w grupie otrzymującej nintedanib i 19,6% w grupie otrzymującej placebo. HR wynosił 0,67 (95% CI: 0,46; 0,98; nominalna wartość p=0,0387), co wskazuje na 33% zmniejszenie ryzyka wystąpienia pierwszego nagłego zaostrzenia ILD lub zgonu u pacjentów otrzymujących nintedanib w porównaniu z placebo (rycina 4).

**Rycina 4 Krzywa Kaplana-Meiera dla czasu do wystąpienia pierwszego nagłego zaostrzenia ILD lub zgonu przez cały okres trwania badania**



bid = dwa razy na dobę

#### Analiza przeżycia

Ryzyko zgonu było mniejsze w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z grupą placebo. HR wynosił 0,78 (95% CI: 0,50; 1,21; nominalna wartość  $p=0,2594$ ), co wskazuje na 22% zmniejszenie ryzyka zgonu u pacjentów otrzymujących nintedanib w porównaniu z placebo.

#### Czas do progresji ( $\geq 10\%$ bezwzględny spadek wartości należnej FVC %) lub zgonu

W badaniu INBUILD ryzyko progresji ( $\geq 10\%$  bezwzględny spadek wartości należnej FVC %) lub zgonu było mniejsze u pacjentów leczonych nintedanibem. Odsetek pacjentów, u których wystąpiło zdarzenie, wynosił 40,4% w grupie otrzymującej nintedanib i 54,7% w grupie otrzymującej placebo. HR wynosił 0,66 (95% CI: 0,53; 0,83;  $p=0,0003$ ), co wskazuje na 34% zmniejszenie ryzyka progresji ( $\geq 10\%$  bezwzględny spadek wartości należnej FVC%) lub zgonu u pacjentów otrzymujących nintedanib w porównaniu z placebo.

#### Jakość życia

Skorygowana średnia zmiana od punktu początkowego w łącznej punktacji uzyskanej w kwestionariuszu K-BILD po upływie 52 tygodni wynosiła -0,79 jednostek w grupie otrzymującej placebo oraz 0,55 w grupie otrzymującej nintedanib. Różnica między grupami leczenia wynosiła 1,34 (95% CI: -0,31; 2,98; nominalna wartość  $p=0,1115$ ).

Skorygowana średnia bezwzględna zmiana w punktacji od punktu początkowego uzyskanej na podstawie kwestionariusza dotyczącego jakości życia z włóknieniem płuc (ang. *Living with Pulmonary Fibrosis*, L-PF) w domenie dotyczącej duszności po upływie 52 tygodni wynosiła 4,28 w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 7,81 w grupie otrzymującej placebo. Skorygowana średnia różnica między grupami na korzyść nintedanibu wynosiła -3,53 (95% CI: -6,14; -0,92; nominalna wartość  $p=0,0081$ ). Skorygowana średnia bezwzględna zmiana w punktacji od punktu

początkowego uzyskanej w domenie objawów włóknienia płuc L-PF dotyczącej kaszlu po upływie 52 tygodni wynosiła -1,84 w grupie otrzymującej nintedanib w porównaniu z 4,25 w grupie otrzymującej placebo. Skorygowana średnia różnica między grupami na korzyść nintedanibu wynosiła -6,09 (95% CI: -9,65; -2,53; nominalna wartość  $p=0,0008$ ).

#### *Choroba śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową (SSc-ILD)*

Skuteczność kliniczną nintedanibu badano u pacjentów z SSc-ILD w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu fazy III (SENSCIS). U pacjentów zdiagnozowano SSc-ILD w oparciu o kryteria klasyfikacji twardziny układowej (*ang. systemic sclerosis*, SSc) Amerykańskiego Kolegium Reumatologii/Europejskiej Ligi Walki z Reumatyzmem z 2013 r. i badanie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (*ang. high resolution computed tomography*, HRCT) klatki piersiowej przeprowadzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W sumie 580 pacjentów zrandomizowano w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej nintedanib dwa razy na dobę lub grupy otrzymującej odpowiednie placebo przez co najmniej 52 tygodnie, z czego 576 pacjentów otrzymało leczenie. Randomizacja była stratyfikowana w oparciu o status przeciwciał przeciw topoizomerazie (*ang. antitopoisomerase antibody*, ATA). Poszczególni pacjenci pozostawali w zaślepionej grupie otrzymującej leczenie w ramach badania przez okres do 100 tygodni (mediana ekspozycji na nintedanib wynosiła 15,4 miesiąca; średnia ekspozycja na nintedanib wynosiła 14,5 miesiąca).

Pierwszorzędowy punkt końcowy stanowił roczny wskaźnik spadku natężonej pojemności życiowej (FVC) w ciągu 52 tygodni. Głównymi drugorzędowymi punktami końcowymi były bezwzględna zmiana od punktu początkowego w wyniku na zmodyfikowanej skali oceny skóry Rodnana (*ang. modified Rodnan Skin Score*, mRSS) po upływie 52 tygodni oraz bezwzględna zmiana od punktu początkowego w całkowitej punktacji w kwestionariuszu SGRQ (*Saint George's Respiratory Questionnaire*) po upływie 52 tygodni.

Kobiety stanowiły 75,2% w całej grupie pacjentów. Średnia (odchylenie standardowe [*ang. standard deviation*, SD, min-maks]) wieku wynosiła 54,0 (12,2; 20-79) lata. Ogółem 51,9% pacjentów miało rozsianą skórą twardzinę układową (SSc), a 48,1% pacjentów miało ograniczoną skórą SSc. Średni (SD) czas od pierwszego wystąpienia objawu, innego niż objaw Raynauda, wynosił 3,49 (1,7) roku. 49,0% pacjentów otrzymywało stałą dawkę mykofenolanu w punkcie początkowym (46,5% otrzymywało mykofenolan mofetylu, 1,9% mykofenolan sodu, 0,5% kwas mykofenolowy). Profil bezpieczeństwa pacjentów stosujących mykofenolan lub niestosujących mykofenolanu w punkcie początkowym był porównywalny.

#### Roczny wskaźnik zmniejszenia FVC

Roczny wskaźnik zmniejszenia FVC (w mL) w ciągu 52 tygodni był istotnie mniejszy, tj. o 41,0 mL, u pacjentów otrzymujących nintedanib w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (tabela 11), co odpowiadało względnej skuteczności leczenia na poziomie 43,8%.

**Tabela 11 Roczny wskaźnik zmniejszenia FVC (w mL) w ciągu 52 tygodni**

|                                                         | Placebo      | Nintedanib<br>150 mg dwa razy na dobę |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Liczba analizowanych pacjentów                          | 288          | 287                                   |
| Wskaźnik <sup>1</sup> (SE) obniżenia w ciągu 52 tygodni | -93,3 (13,5) | -52,4 (13,8)                          |
| Porównanie z placebo                                    |              |                                       |
| Różnica <sup>1</sup>                                    |              | 41,0                                  |
| 95% CI                                                  |              | (2,9; 79,0)                           |
| Wartość p                                               |              | < 0,05                                |

<sup>1</sup>Na podstawie współczynnika regresji dla efektów losowych ze stałymi kategorycznymi efektami leczenia, status ATA, płeć, stałe ciągle efekty czasu, FVC [w mL] w punkcie początkowym, wiek, wzrost oraz z uwzględnieniem zależności leczenia i czasu oraz punktu początkowego i czasu. Efekt losowy został włączony do określonego dla pacjenta punktu przecięcia i czasu. Błędy wewnątrzsobnicze były


modelowane z wykorzystaniem nieustrukturyzowanej macierzy wariancji-kowariancji. Zmienność osobnicza była modelowana z wykorzystaniem komponentów wariancyjnych macierzy wariancji-kowariancji.

Wpływ nintedanibu na roczny wskaźnik spadku FVC był zbliżony we wszystkich z góry ustalonych analizach wrażliwości i nie wykryto żadnej heterogenności w uprzednio określonych podgrupach (np. w podziale wg wieku, płci i stosowania mykofenolanu).

Dodatkowo, obserwowano podobny wpływ na inne punkty końcowe dotyczące czynności płuc, tj. bezwzględna zmiana wartości FVC w mL w stosunku do punktu początkowego po upływie 52 tygodni (rycina 5 i tabela 12) oraz odsetek zmniejszenia FVC wyrażony w % wartości należnej po upływie 52 tygodni (tabela 13), które dostarczyły dodatkowych dowodów na wpływ nintedanibu na spowolnienie progresji SSc-ILD. Ponadto u mniejszej liczby pacjentów w grupie otrzymującej nintedanib obserwowano bezwzględne zmniejszenie > 5% wartości należnej (20,6% w grupie nintedanibu w porównaniu z 28,5% w grupie placebo, OR=0,65; p=0,0287). Względne zmniejszenie FVC w mL > 10% było porównywalne w obu grupach (16,7% w grupie nintedanibu w porównaniu z 18,1% w grupie placebo, OR=0,91; p=0,6842). W tych analizach w miejscu brakujących wartości

### Rycina 5 Średnia (SEM) zaobserwowana zmiana FVC od punktu początkowego (w mL) w ciągu 52 tygodni

FVC po upływie 52 tygodni zamieszczono najgorsze wartości obserwowane u pacjenta w trakcie leczenia.



Liczba pacjentów  
Placebo  
Nintedanib 150 bid

|            |            |           |            |             |            |             |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 2 tygodnie | 4 tygodnie | 6 tygodni | 12 tygodni | 24 tygodnie | 36 tygodni | 52 tygodnie |
| 283        | 281        | 280       | 283        | 280         | 268        | 257         |
| 283        | 281        | 273       | 278        | 265         | 262        | 241         |

Z analizy eksploracyjnej danych do 100. tygodnia (maksymalny okres leczenia w badaniu SENSICIS) wynikało, że wpływ leczenia nintedanibem na spowalnianie progresji SSc-ILD utrzymywał się po upływie 52 tygodni.

bid = dwa razy na dobę

**Tabela 12 Bezwzględna zmiana od punktu początkowego wartości FVC (w mL) po upływie 52 tygodni**

|                                                                               | Placebo        | Nintedanib<br>150 mg dwa razy na dobę |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Liczba analizowanych pacjentów                                                | 288            | 288                                   |
| Średnia (SD) w punkcie początkowym                                            | 2541,0 (815,5) | 2458,5 (735,9)                        |
| Średnia <sup>1</sup> (SE) zmiana od punktu początkowego po upływie 52 tygodni | -101,0 (13,6)  | -54,6 (13,9)                          |
| Porównanie z placebo                                                          |                |                                       |
| Średnia <sup>1</sup>                                                          |                | 46,4                                  |
| 95% CI                                                                        |                | (8,1; 84,7)                           |
| Wartość p                                                                     |                | < 0,05                                |

<sup>1</sup>Na podstawie modelu mieszanego z powtarzanymi pomiarami (ang. *Mixed Model for Repeated Measures*, MMRM), ze stałymi kategoryjnymi efektami statusu ATA, wizyty, zależności leczenia i wizyty, punktu początkowego i wizyty, wieku, płci i wzrostu. Wizyta była powtarzanym pomiarem. Błędy wewnątrzosobnicze były modelowane z wykorzystaniem nieustrukturyzowanej macierzy wariancji-kowariancji. Skorygowana średnia została obliczona w oparciu o wszystkich analizowanych pacjentów w modelu (nie tylko pacjentów z pomiarem w punkcie początkowym i 52 .tygodniu).

**Tabela 13 Roczny wskaźnik zmniejszenia FVC (% wartości należnej) w ciągu 52 tygodni**

|                                                                | Placebo    | Nintedanib<br>150 mg dwa razy na dobę |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Liczba analizowanych pacjentów                                 | 288        | 287                                   |
| Wskaźnik <sup>1</sup> (SE) zmniejszenia FVC w ciągu 52 tygodni | -2,6 (0,4) | -1,4 (0,4)                            |
| Porównanie z placebo                                           |            |                                       |
| Różnica <sup>1</sup>                                           |            | 1,15                                  |
| 95% CI                                                         |            | (0,09; 2,21)                          |
| Wartość p                                                      |            | < 0,05                                |

<sup>1</sup>Na podstawie współczynnika regresji dla efektów losowych ze stałymi kategoryjnymi efektami leczenia, status ATA, stałe ciągłe efekty czasu, FVC [% wartości należnej] w punkcie początkowym oraz z uwzględnieniem leczenia i czasu oraz punktu początkowego i czasu. Efekt losowy został włączony do określonego dla pacjenta punktu przecięcia i czasu. Błędy wewnątrzosobnicze były modelowane z wykorzystaniem nieustrukturyzowanej macierzy wariancji-kowariancji. Zmienność osobnicza była modelowana z wykorzystaniem komponentów wariancyjnych macierzy wariancji-kowariancji.

**Zmiana od punktu początkowego w wyniku na zmodyfikowanej skali oceny skóry Rodnana (mRSS) po upływie 52 tygodni**

Skorygowana średnia bezwzględnej zmiany od punktu początkowego w wyniku na skali mRSS po upływie 52 tygodni była porównywalna w grupie otrzymującej nintedanib (-2,17 (95% CI -2,69; -1,65)) i w grupie placebo (-1,96 (95% CI -2,48; -1,45)). Różnica w skorygowanej średniej między grupami leczenia wynosiła -0,21 (95% CI -0,94; 0,53; p = 0,5785).

**Zmiana od punktu początkowego w całkowitej punktacji w kwestionariuszu SGRQ po upływie 52 tygodni**

Skorygowana średnia bezwzględnej zmiany od punktu początkowego w całkowitej punktacji SGRQ po upływie 52 tygodni była porównywalna w grupie otrzymującej nintedanib (0,81 (95% CI -0,92; 2,55)) i w grupie placebo (-0,88 (95% CI -2,58; 0,82)). Różnica w skorygowanej średniej między grupami leczenia wynosiła 1,69 (95% CI -0,73; 4,12; p = 0,1711).

### Analiza przeżycia

Śmiertelność dla całego badania była porównywalna w grupie otrzymującej nintedanib (N = 10; 3,5%) i w grupie placebo (N = 9; 3,1%). Analiza czasu do zgonu w całym badaniu wykazała HR na poziomie 1,16 (95% CI 0,47, 2,84; p=0,7535).

### Odstęp QT

W dedykowanym badaniu z udziałem pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym zanotowano pomiary OT/OTc, które wykazały, że pojedyncza dawka doustna 200 mg nintedanibu, jak również wielokrotne dawki doustne 200 mg nintedanibu podawane dwa razy na dobę przez 15 dni nie spowodowały wydłużenia odstępu QTcF.

### Dzieci i młodzież

*Klinicznie istotne, postępujące, przebiegające z włóknieniem śródmiąższowe choroby płuc (ILD) oraz choroba śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową (SSc-ILD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat*

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność kliniczną nintedanibu u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z klinicznie istotnymi, przebiegającymi z włóknieniem śródmiąższowymi chorobami płuc (ang. *interstitial lung disease* – ILD) oceniano w eksploracyjnym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu fazy III (InPedILD 1199.337).

Głównymi celami badania InPedILD była ocena zależności ekspozycji od dawki i bezpieczeństwa stosowania nintedanibu u dzieci i młodzieży z klinicznie istotną, przebiegającą z włóknieniem ILD. Skuteczność oceniano jedynie jako cel drugorzędowy.

Do badania InPedILD włączono dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat z klinicznie istotną, przebiegającą z włóknieniem ILD i FVC wynoszącą co najmniej 25% wartości należnej. Pacjentów sklasyfikowano jako chorujących na przebiegającą z włóknieniem ILD na podstawie włóknienia udowodnionego w dwóch badaniach HRCT (przy czym jedno badanie HRCT musiało być wykonane w ciągu ostatnich 12 miesięcy) lub włóknienia udowodnionego w biopsji płuc i w jednym badaniu HRCT przeprowadzonym w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Klinicznie istotną chorobę zdefiniowano jako wynik  $\geq 3$  według klasyfikacji Fana lub udokumentowany dowód progresji klinicznej w dowolnych ramach czasowych. Dowodem progresji klinicznej były względny spadek FVC  $\geq 10\%$  wartości należnej, względny spadek FVC o 5–10% wartości należnej z zaostrzeniem objawów, zaostrzenie włóknienia w badaniu HRCT lub wyniki innych pomiarów klinicznego zaostrzenia przypisywane postępującemu włóknieniu płuc (np. zwiększone zapotrzebowanie na tlen, zmniejszona pojemność dyfuzyjna), niemniej nie było to wymogiem włączenia do badania dla pacjentów z wynikiem  $\geq 3$  według klasyfikacji Fana.

Pacjentów zrandomizowano w stosunku 2:1 do otrzymywania nintedanibu dwa razy na dobę (dawki dostosowane do masy ciała, w tym stosowanie kapsułki 25 mg) lub równowartości placebo przez 24 tygodnie, po czym następowało leczenie nintedanibem metodą otwartej próby przez różny czas. Dozwolone było stosowanie standardowego leczenia, jeśli lekarz prowadzący uznał, że istnieją ku temu wskazania kliniczne.

W sumie zrandomizowano 39 pacjentów (61,5% płci żeńskiej). Charakterystyka podstawowa:

- (6-11 lat: 12 pacjentów, 12-17 lat: 27 pacjentów). Średnia [odchylenie standardowe (SD)] wieku wynosiła 12,6 (3,3) roku.
- Średnia (SD) masy ciała wynosiła 42,2 kg (17,8 kg); 6-11 lat: 26,6 kg (10,4 kg), 12-17 lat: 49,1 kg (16,0 kg).
- Ogólny średni z-score dla BMI do wieku w punkcie początkowym (SD) wynosił -0,6 (1,8).
- Ogólny średni z-score dla FVC (SD) w punkcie początkowym wynosił -3,5 (1,9).

Najczęstszymi pojedynczymi zasadniczymi rozpoznaniem ILD były

- „niedobór białka czynnika powierzchniowego” (nintedanib: 26,9%; placebo: 38,5%),
- „twardzina układowa” (nintedanib: 15,4%; placebo: 23,1%) i

- „toksyczne/popromienne/indukowane lekami zapalenie płuc” (nintedanib: 11,5%; placebo: 7,7%).
- Przewlekłe zapalenie płuc z nadwrażliwości zgłoszono u 2 pacjentów (nintedanib: 7,7%).
- Pozostałymi zasadniczymi rozpoznaniem ILD zgłaszanymi każdorazowo dla 1 pacjenta było:
  - włóknienie po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT),
  - młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów,
  - młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,
  - zapalenie skórno- mięśniowe,
  - złuszczone śródmiąższowe zapalenie płuc,
  - grypa H1N1,
  - rozpoznanie niejasne (przewlekła rozsiana choroba płuc),
  - zespół COPA,
  - mutacja genu COPA,
  - nieodróżniona choroba tkanki łącznej,
  - poinfekcyjne zarostowe zapalenie oskrzelików,
  - nieokreślona ILD,
  - waskulopatia idiopatyczna
  - waskulopatia zależna od STING.


Wyniki dotyczące pierwszorzędowych punktów końcowych były następujące:

- **Ekspozycja na nintedanib:**
  - Ekspozycja na nintedanib opisana jako  $AUC_{t,ss}$  na podstawie próbek pobranych przy stężeniu w stanie stacjonarnym była zasadniczo podobna u dzieci i młodzieży oraz porównywalna do  $AUC_{t,ss}$  obserwowanego u dorosłych (patrz punkt 5.2).
- **Zdarzenia niepożądane w trakcie leczenia (24. tydzień):**
  - Grupa otrzymująca nintedanib: 84,6 % pacjentów (6 - 11 lat: 75,0 %, 12 - 17 lat: 88,9 %)
  - Grupa otrzymująca placebo: 84,6 % pacjentów (6 - 11 lat: 100 %, 12 - 17 lat: 77,8 %)

Zmiana wartości należnej natężonej pojemności życiowej (FVC %) od punktu początkowego była drugorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności. Wyniki (rycina 6):

- **24. tydzień:**
  - Grupa otrzymująca nintedanib: skorygowana średnia zmiana = 0,31 (95 % CI: -2,36; 2,98)
  - Grupa otrzymująca placebo: skorygowana średnia zmiana = -0,89 (95 % CI: -4,61; 2,82)
  - Różnica wartości należnej FVC % wynosiła 1,21 (95 % CI -3,40; 5,81) na korzyść nintedanibu.
- **52. tydzień:**
  - Grupa otrzymująca nintedanib po randomizacji: skorygowana średnia zmiana = 0,79 (95% CI: -2,95; 4,53)
  - Grupa otrzymująca placebo po randomizacji: skorygowana średnia zmiana = -0,98 (95% CI: -6,26; 4,30)

**Rycina 6 Skorygowana średnia (SE) bezwzględnej zmiany od punktu początkowego wartości należnej FVC % przez 52 tygodnie - populacja leczona\***



\* Po 24 tygodniach leczenia wszyscy pacjenci otrzymali nintedanib w otwartej części badania.

W odniesieniu do punktu końcowego obejmującego wartość należną FVC % oraz wielu innych eksploracyjnych punktów końcowych dotyczących skuteczności obserwowano dużą zmienność w zakresie odpowiedzi na leczenie nintedanibem wśród pacjentów w grupie dzieci i młodzieży.

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań referencyjnego produktu leczniczego zawierającego nintedanib we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w IPF.

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań referencyjnego produktu leczniczego zawierającego nintedanib w populacji dzieci w wieku poniżej 6 lat z przebiegającymi z włóknieniem ILD (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

## 5.2 Właściwości farmakokinetyczne

### Wchłanianie

Nintedanib osiąga maksymalne stężenie w osoczu około 2-4 godziny po doustnym podaniu miękkiej kapsułki żelatynowej po posiłku (zakres: od 0,5 do 8 godzin). Bezwzględna dostępność biologiczna dawki 100 mg u zdrowych ochotników wynosiła 4,69% (90% CI: 3,615-6,078). Wchłanianie i dostępność biologiczna zmniejszyły się wskutek efektów działania transporterów i znaczącego metabolizmu pierwszego przejścia. Ekspozycja na nintedanib zwiększała się proporcjonalnie do dawki w zakresie dawek od 50 do 450 mg raz na dobę i od 150 do 300 mg dwa razy na dobę. Stężenie leku w osoczu w stanie stacjonarnym było osiągane najpóźniej w ciągu jednego tygodnia.

Po spożyciu posiłku ekspozycja na nintedanib była zwiększona o około 20% w porównaniu do podawania na czczo (CI: 95,3-152,5%), a wchłanianie było opóźnione (mediana  $t_{maks}$  na czczo: 2,00 godziny; po posiłku: 3,98 godziny).

W badaniu *in vitro* wymieszanie kapsułek nintedanibu z niewielką ilością musu jabłkowego lub budyniu czekoladowego, na maksymalnie 15 minut, nie miało wpływu na jakość

farmaceutyczną. W przypadku dłuższej ekspozycji na miękki pokarm obserwowano pęcznienie i deformację kapsułek w wyniku wchłaniania wody przez żelatynową osłonkę kapsułki. Dlatego nie oczekuje się, aby przyjmowanie kapsułek z miękkim pokarmem wpływało na działanie kliniczne, jeśli będą przyjmowane natychmiast.

W badaniu względnej biodostępności nintedanibu, po podaniu zdrowym, dorosłym mężczyznom pojedynczej dawki w postaci jednej miękkiej kapsułki żelatynowej 100 mg lub czterech miękkich kapsułek żelatynowych 25 mg, biodostępność była podobna w obu przypadkach.

### Dystrybucja

Nintedanib podlega co najmniej dwufazowej kinetyce dyspozycji leku. Po infuzji dożylniej zaobserwowano dużą objętość dystrybucji ( $V_{ss}$ : 1 050 L, 45,0% gCV).

Wiązanie nintedanibu z białkami ludzkiego osocza w warunkach *in vitro* jest duże i osiąga 97,8%. Uważa się, że nintedanib wiąże się głównie z albuminami surowicy. Ulega głównie preferencyjnej dystrybucji w osoczu, osiągając proporcję krew: osocze wynoszącą 0,869.

### Metabolizm

Nintedanib jest głównie metabolizowany w drodze hydrolitycznego rozszczepienia przez esterazy, prowadzącego do utworzenia wolnej reszty kwasowej BIBF 1202. BIBF 1202 ulega następnie glukuronidacji przez enzymy urydino 5'-difosforo-glukuronosyltransferazy (UGT), takie jak UGT 1A1, UGT 1A7, UGT 1A8, i UGT 1A10 do glukuronianu BIBF 1202.

Metabolizm nintedanibu tylko w niewielkim stopniu zachodzi przy udziale enzymów CYP, z których głównym enzymem biorącym udział w metabolizmie nintedanibu jest CYP 3A4. W badaniu ADME, obejmującym ludzi, nie wykryto w osoczu głównego metabolitu zależnego od szlaku CYP.

W warunkach *in vitro* metabolizm zależny od CYP stanowi około 5% w porównaniu do około 25% dla rozkładu przez esterazy. W badaniach nieklinicznych nintedanib, BIBF 1202 i glukuronian BIBF 1202 nie hamowały ani nie indukowały enzymów CYP, dlatego nie należy się spodziewać występowania interakcji lekowych między nintedanibem a substratami CYP, inhibitorami CYP ani induktorami CYP.

### Eliminacja

Całkowity klirens osoczowy po infuzji dożylniej był duży (CL: 1 390 mL/minutę, 28,8% gCV). Wydalanie niezmiennionej substancji czynnej z moczem w ciągu 48 godzin wynosiło około 0,05% dawki (31,5% gCV) po podaniu doustnym i około 1,4% dawki (24,2% gCV) po podaniu dożylnym; klirens nerkowy wynosił 20 mL/minutę (32,6% gCV). Główną drogą eliminacji dawki radioaktywnej po doustnym podaniu nintedanibu znakowanego węglem [ $^{14}$ C] było wydalanie z żółcią/stolcem (93,4% dawki; 2,61% gCV). Wydalanie przez nerki miało niewielki udział w ogólnym klirensie (0,649% dawki; 26,3% gCV). Do całkowitej eliminacji leku (ponad 90%) dochodziło w ciągu 4 dni po podaniu. Okres półtrwania nintedanibu w fazie eliminacji wynosił od 10 do 15 godzin (gCV % około 50%).

### Liniowość lub nielineowość

Farmakokinetyka (PK) nintedanibu może być uważana za liniową w odniesieniu do czasu (tzn. dane po podaniu pojedynczej dawki mogą być zastosowane w sytuacji podawania wielokrotnego).

Kumulacja po podaniu wielokrotnym wynosiła 1,04-krotność dla  $C_{maks}$  i 1,38-krotność dla  $AUC_{\tau}$ .

Stężenie minimalne nintedanibu utrzymywało się na stałym poziomie przez ponad rok.

### Transport

Nintedanib jest substratem P-gp. Możliwość interakcji między nintedanibem a tym nośnikiem, patrz punkt 4.5. W warunkach *in vitro* wykazano, że nintedanib nie jest substratem ani inhibitorem OATP-1B1, OATP-1B3, OATP-2B1, OCT-2 ani MRP-2. Nintedanib nie jest także substratem BCRP. W warunkach *in vitro* zaobserwowano tylko słabe działanie hamujące OCT-1, BCRP i P-gp, które ma małe znaczenie kliniczne. To samo dotyczy nintedanibu jako substratu OCT-1.

### Analiza farmakokinetyki populacyjnej w szczególnych grupach pacjentów

Właściwości farmakokinetyczne nintedanibu były podobne u zdrowych ochotników, pacjentów z IPF,

pacjentów z innymi przewlekłymi przebiegającymi z włóknieniemILD o fenotypie postępującym, pacjentów z SSc-ILD oraz u pacjentów onkologicznych. Na podstawie wyników analizy populacyjnej PK (PopPK) pacjentów z IPF i niedrobnokomórkowym rakiem płuc (N=1 191) i badań opisowych na ekspozycję na nintedanib nie miała wpływu płeć (skorygowana o masę ciała), łagodne i umiarkowane zaburzenie czynności nerek (oszacowane na podstawie klirensu kreatyniny), spożywanie alkoholu ani genotyp P-gp.

Analizy PopPK wskazały umiarkowany wpływ wieku, masy ciała i rasy na ekspozycję (patrz poniżej). Biorąc pod uwagę dużą międzyosobniczą zmienność ekspozycji obserwowane wpływy uważa się za nieistotne klinicznie (patrz punkt 4.4).

#### *Wiek*

Ekspozycja na nintedanib wzrastała liniowo wraz z wiekiem.  $AUC_{\tau,ss}$  było zmniejszone o 16% u 45-letniego pacjenta i zwiększone o 13% u 76-letniego pacjenta w odniesieniu do pacjenta o medianie wieku 62 lat. Zakres wieku pacjentów objętych analizą wynosił od 29 do 85 lat; około 5% pacjentów z tej populacji miało ponad 75 lat. W oparciu o model PopPK, zwiększenie ekspozycji na nintedanib o około 20–25% zaobserwowano u pacjentów w wieku  $\geq 75$  lat w porównaniu do pacjentów w wieku poniżej 65 lat.

#### *Dzieci i młodzież*

Na podstawie analizy danych farmakokinetycznych pochodzących z badania InPedILD (1199.337) podanie doustne nintedanibu zgodnie z algorytmem dawkowania opartym na masie ciała prowadziło do ekspozycji w zakresie obserwowanym u pacjentów dorosłych. Obserwowana średnia geometryczna (geometryczny współczynnik zmienności) ekspozycji wyrażonej jako  $AUC_{\tau,ss}$  wynosiła 175 ng/mL·godzinę (85,1%) i 167 ng/mL·godz. (83,6%) odpowiednio u 10 pacjentów w wieku od 6 do 11 lat i u 23 pacjentów w wieku od 12 do 17 lat.

Analizy zależności ekspozycja-odpowiedź, na podstawie danych z badania InPedILD, wykazały zależność podobną do  $E_{max}$  między ekspozycją a wartością należną FVC % oraz z-score FVC, popartą danymi dotyczącymi osób dorosłych. Dla wartości należnej FVC %  $EC_{50}$  wynosiło 4,4 ng/mL (względny błąd standardowy: 28,6%), a dla z-score FVC  $EC_{50}$  wynosiło 5,0 ng/mL (względny błąd standardowy: 75,3%).

Nintedanibu nie badano u dzieci i młodzieży z zaburzeniem czynności wątroby.

U dzieci i młodzieży z przebiegającą z włóknieniemILD i łagodnym zaburzeniem czynności wątroby (klasa A w skali Child-Pugh) modelowanie farmakokinetyki populacyjnej wskazuje, że zalecane zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2) skutkowałoby ekspozycją zgodną z ekspozycją na nintedanib u dorosłych pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby (klasa A w skali Child-Pugh) przy odpowiedniej zalecanej zmniejszonej dawce.

#### *Masa ciała*

Zaobserwowano ujemną korelację pomiędzy masą ciała a ekspozycją na nintedanib.  $AUC_{\tau,ss}$  było zwiększone o 25% u ważącego 50 kg pacjenta (5. percentyl) i zmniejszone o 19% u ważącego 100 kg pacjenta (95. percentyl) w odniesieniu do pacjenta o medianie masy 71,5 kg.

#### *Rasa*

Średnia ekspozycja populacji na nintedanib była o 33% – 50% większa u pacjentów z Chin, Tajwanu i Indii oraz o 16% większa u pacjentów z Japonii, natomiast o 16% – 22% mniejsza u pacjentów z Korei, w odniesieniu do pacjentów rasy białej (skorygowana o masę ciała). Dane pochodzące od pacjentów rasy czarnej były bardzo ograniczone, ale mieściły się w tym samym zakresie, co dane pacjentów rasy białej.

#### *Zaburzenie czynności wątroby*

W badaniu fazy I, w którym oceniano stosowanie pojedynczej dawki nintedanibu, ekspozycja na nintedanib oceniana na podstawie  $C_{maks}$  i AUC była 2,2-krotnie większa u ochotników z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby niż u osób zdrowych (A w skali Child-Pugh; 90% CI, odpowiednio, 1,3 – 3,7 dla  $C_{maks}$  i 1,2 – 3,8 dla AUC). U ochotników z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (B w skali Child-Pugh) ekspozycja oceniana na podstawie  $C_{maks}$  (90% CI 4,4 – 13,2) była 7,6-krotnie większa niż u zdrowych ochotników i 8,7-krotnie większa niż u zdrowych ochotników oceniana na podstawie AUC (5,7 – 13,1). Nie prowadzono badań z udziałem pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (C w skali Child-Pugh).

### *Jednoczesne leczenie pirfenidonem*

Jednoczesne leczenie nintedanibem z pirfenidonem badano w dedykowanym badaniu farmakokinetycznym z udziałem pacjentów z IPF. Grupa 1 otrzymywała pojedynczą dawkę 150 mg nintedanibu przed i po zwiększeniu dawki pirfenidonu do 801 mg trzy razy na dobę w stanie stacjonarnym (N=20 pacjentów poddanych leczeniu). Grupa 2 otrzymywała leczenie 801 mg pirfenidonu w stanie stacjonarnym trzy razy na dobę i dokonywano u nich oceny profilu farmakokinetycznego przed i po co najmniej 7 dniach jednoczesnego leczenia z zastosowaniem 150 mg nintedanibu dwa razy na dobę (N=17 pacjentów poddanych leczeniu). W grupie 1, skorygowany współczynnik średniej geometrycznej (90% przedział ufności (ang. *confidence interval* – CI)) wynosił 93% (57% - 151%) i 96% (70% - 131%) odpowiednio dla  $C_{max}$  i  $AUC_{0-tz}$  nintedanibu (n=12 dla porównania międzysobniczego). W grupie 2, skorygowany współczynnik średniej geometrycznej (90% CI) wynosił 97% (86% - 110%) i 95% (86% - 106%) odpowiednio dla  $C_{max,ss}$  i  $AUC_{\tau,ss}$  pirfenidonu (n=12 dla porównania międzysobniczego). Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, nie ma dowodów na istnienie istotnej międzylekowej interakcji farmakokinetycznej pomiędzy nintedanibem a pirfenidonem w przypadku podawania ich w skojarzeniu (patrz punkt 4.4).

### *Jednoczesne leczenie z bozentanem*

Jednoczesne leczenie nintedanibem i bozentanem badano w dedykowanym badaniu farmakokinetycznym z udziałem zdrowych ochotników. Uczestnicy otrzymali pojedynczą dawkę 150 mg nintedanibu przed i po wielokrotnym podaniu 125 mg bozentanu dwa razy na dobę w stanie stacjonarnym. Skorygowany współczynnik średniej geometrycznej (90% przedział ufności (CI)) wynosił 103% (86% - 124%) i 99% (91% - 107%) odpowiednio dla  $C_{max}$  i  $AUC_{0-tz}$  nintedanibu (n=13), wskazując na to, że jednoczesne podawanie nintedanibu z bozentanem nie wpływało na farmakokinetykę nintedanibu.

### *Jednoczesne leczenie z doustnymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi*

W dedykowanym badaniu farmakokinetyki pacjentki z SSc-ILD otrzymywały pojedynczą dawkę skojarzenia 30 µg etynyloestradiolu i 150 µg lewonorgestrelu przed i po podawaniu 150 mg nintedanibu dwa razy na dobę przez co najmniej 10 dni. Skorygowany współczynnik średniej geometrycznej (90% przedział ufności (CI)) wynosił odpowiednio 117% (108% - 127%;  $C_{max}$ ) i 101% (93% - 111%;  $AUC_{0-tz}$ ) dla etynyloestradiolu oraz 101% (90% - 113%;  $C_{max}$ ) i 96% (91% - 102%;  $AUC_{0-tz}$ ) dla lewonorgestrelu (n=15), co wskazuje na to, że jednoczesne podawanie nintedanibu nie ma żadnego znaczącego wpływu na ekspozycję na etynyloestradiol i lewonorgestrel w osoczu.

### *Zależność ekspozycja-odpowiedź*

Analizy zależności ekspozycja-odpowiedź u pacjentów z IPF i innymi przewlekłymiILD przebiegającymi z włóknieniem o fenotypie postępującym wskazywały na niewielką zależność między stężeniem nintedanibu w osoczu a zwiększeniem aktywności AlAT i (lub) AspAT. Faktyczna podana dawka może być lepszym czynnikiem predykcyjnym ryzyka wystąpienia biegunki o dowolnym nasileniu, nawet jeśli nie można wykluczyć stężenia w osoczu jako czynnika determinującego ryzyko (patrz punkt 4.4).  
Analizy dotyczące zależności ekspozycja-odpowiedź u dzieci i młodzieży, patrz podpunkt „Dzieci i młodzież”.

## **5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie**

### Ogólna toksyczność

Badania toksyczności jednorazowej dawki u szczurów i myszy wskazują na niewielkie działanie toksyczne nintedanibu. W badaniach toksyczności po wielokrotnym podaniu u młodych szczurów obserwowano nieodwracalne zmiany w szklawie i zębnie ciągle szybko rosnących siekaczy, ale nie w przedtrzonowcach lub trzonowcach. Ponadto obserwowano pogrubienie chrząstek nasadowych w fazach wzrostu kości, jednak było ono odwracalne po przerwaniu leczenia. Zmiany te obserwuje się po stosowaniu innych inhibitorów VEGFR-2 i mogą być uważane za działania klasy leków.

W badaniach toksyczności obejmujących zwierzęta inne niż gryzonie obserwowano biegunkę i wymioty oraz zmniejszone spożycie karmy i zmniejszenie masy ciała.

Nie ma dowodów zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych u szczurów, psów i makaków jawańskich. Łagodne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, niezwiązane z poważnymi działaniami niepożądanymi, takimi jak biegunka, obserwowane były tylko u makaków reżus.

#### Toksyczny wpływ na rozród i rozwój potomstwa

U szczurów działanie letalne na zarodki i płody oraz działanie teratogenne obserwowano w przypadku ekspozycji na poziomie niższym niż ekspozycja u ludzi, przy wartości MRHD (ang. Maximum Recommended Human Dose), wynoszącej 150 mg dwa razy na dobę. Zaobserwowano także nieznaczny wpływ na rozwój szkieletu osiowego i dużych tętnic przy ekspozycji na poziomie poniżej wartości leczniczej.

U królików działanie letalne na zarodki i płody oraz działanie teratogenne obserwowano po ekspozycji około 3 razy większej od występującej po MRHD, ale już po ekspozycji niższej od występującej po MRHD wynoszącej 150 mg dwa razy na dobę obserwowano niejednoznaczne działanie na rozwój zarodkowo-płodowy szkieletu osiowego i serca.

W badaniu rozwoju pre- i postnatalnego u szczurów, wpływ na rozwój pre- i postnatalny zaobserwowano przy ekspozycji mniejszej od występującej przy MRHD.

Badanie płodności samców i wczesnego rozwoju zarodkowego do czasu zagnieżdżenia zarodka u szczurów nie wykazały żadnego wpływu na układ rozrodczy i płodność u samców.

U szczurów niewielkie ilości nintedanibu znakowanego radioizotopem i (lub) jego metabolitów przenikały do mleka samic ( $\leq 0,5\%$  podanej dawki).

Dwuletnie badania rakotwórczości u myszy i szczurów nie dostarczyły dowodów na rakotwórcze działanie nintedanibu.

Badania genotoksyczności nie wykazały mutagennego działania nintedanibu.

## **6. DANE FARMACEUTYCZNE**

### **6.1 Wykaz substancji pomocniczych**

#### Zawartość kapsułki

triglicerydy średniołańcuchowe  
tłuszcz utwardzony  
poliglicerolu 3-dioleinian (E 475)

#### Otoczka kapsułki

żelatyna (E 441)  
glicerol (85%) (E 422)  
tytanu dwutlenek (E 171)  
żelaza tlenek czerwony (E 172)  
żelaza tlenek żółty (E172)  
woda oczyszczona

#### Tusz 100 mg

szelak (E 904)  
karmin (E 120)  
glikol propylenowy (E 1520)  
symetykon

#### Tusz 150 mg

szelak (E 904)  
żelaza tlenek czarny (E 172)  
glikol propylenowy (E 1520)

## **6.2 Niezgodności farmaceutyczne**

Nie dotyczy.

## **6.3 Okres ważności**

3 lata

## **6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

## **6.5 Rodzaj i zawartość opakowania**

30 x 1 kapsułka miękka w perforowanych blisterach jednodawkowych z folii OPA/Aluminium/PVC-Aluminium w tekturowym pudełku.

60 x 1 kapsułka miękka w perforowanych blisterach jednodawkowych z folii OPA/Aluminium/PVC-Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

## **6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania**

W razie kontaktu z zawartością kapsułki należy niezwłocznie umyć ręce dużą ilością wody (patrz punkt 4.2).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

## **7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Sandoz Polska Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 50C  
02-672 Warszawa  
Polska

## **8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Nintedanib Sandoz 100 mg kapsułki miękkie:

Pozwolenie nr: 28902

Nintedanib Sandoz 150 mg kapsułki miękkie:

Pozwolenie nr: 28903

## **9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA**

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04.03.2025 r.

**10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO**

**08.12.2025 r.**